

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]


14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSH



blaßd'braun
h'grüne Schräggitter

Buchenwald auf mäßig frischem Kalkschutthang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (bis frisch)

in der

Öko-Serie der Kalkschutthänge

(Flach- bis mittelgründige (25 - 40 cm), selten tiefgründige (60 cm), +/- steinige, lehmige bis schluffig-tonige Lösungsrückstände der (Dolomit- und) Kalksteinverwitterung des Oberen und Mittleren Muschelkalks sowie des Braunen Jura mit wechselndem Kalkspiegel im Oberboden; bis 25 cm Schlufflehmauflage oder -beimengung möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge überwiegend schattseitige Hänge, Unterhänge und Hangmulden
	Bodentyp	Rendzina-Terra fusca bis Braunerde-Terra fusca
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Miliun effusum-, Mercurialis perennis-, Carex montana-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, (Rubus-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	Aufnahmen	23 Vegetationsaufnahmen (2006 bis 2015)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch); Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Spitzahorn, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	Dgl	2	2	1	2
		Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
		Ta	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	TrEi	3	2	1	2
		StEi	3	2	1	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
sonstige Laubbaumarten		FAh, SAh, VKir				
sonstige Nadelbaumarten		ELä				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	644,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (11,6 %)
	Kartierzeitraum	vor1970 - 90,1 %
		2010-19 - 0,7 %
		2000-09 - 0,2 %
		1990-99 - 8,9 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	6907, 9409, 6906, 10026, 9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de