

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

ML+

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem Mischlehm



h'braun
d'grüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis grundfrisch

in der


Öko-Serie der Mischlehme

(Mittel- bis tiefgründige, über 40 cm mächtige, durchlässige, sandig-kiesige bis schluffige Lehme, örtlich lehmiger Kies der Moräne- und Schotterverwitterung über Dolomit- und Kalkverwitterungslehm oder Muschelkalkgestein; auch über kristallinem Untergrund; örtlich weniger durchlässig über Unterem Muschelkalk oder Keuper)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Mulden, selten ebene Lagen, mit kolluvial verstärkten Böden
	Bodentyp	Parabraunerde, örtlich schwach pseudovergleyt
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, (Miliun effusum) - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2008)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne und Frauenfarn
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche)
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	2	2	1	1
		Fi	2	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	TrEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	3	2	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBU, SWei, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	30 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,3 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	11,3 %		
		1970-79	-	88,7 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7908, 7912, 10016				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de