

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeH-

Buchen-Traubeneichen-Hainbuchen-Wald auf mäßig trockenem Mergelhang



oliv
d'gelbe Schräggitter
d'gelbe Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken bis trocken

in der


Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Kleinsteinerige, wenig plastizierte, lehmig-tonige Verwitterung von dolomitischen Mergeln des Mittleren und Unteren Muschelkalks; freies Karbonat meist oberflächennah; Mergelton-Ausbildung mit mehr als 15/20 cm plastiziertem, karbonathaltigem Ton)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hanglagen
	Bodentyp	Mergelrendzina
	Humusform	Mull bis Moder (Hagermoder)
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Carex montana-, Asarum europaeum-, Miliun effusum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Rubus-, (Carex flacca-, Ajuga reptans-, Vaccinium) - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2013 bis 2015)
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald mit Primel; Seggen-Buchenwald mit Primel
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche, Hainbuche (Weißbuche)
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Eibe, Feldahorn, Gemeine Esche, Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche, Waldkiefer

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	1	2	3
		TrEi	1	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Elsbe, FAh, HBu, MeBe, SAh				
	sonstige Nadelbaumarten	SKie				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	17,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,25 %)				
	Kartierzeitraum	vor1970 - 89,9 %				
		2010-19 - 10,1 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	6907 (MH-), 10016				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de