

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SaLH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Sandlehmbhang



orange
h'grüne Schräggitter
h'grüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis frisch

in der

Öko-Serie der Sandlehmhänge

(Mehr als 30 cm meist lockerer, unterschiedlich steiniger, lehmiger Sand (bis stark sandiger Lehm) aus Verwitterung des Schilfsandsteins und des Stubensandsteins; zum Teil zweischichtig mit lehmigem Ton zwischen 40 und 70 cm Tiefe; flache und steile Hanglagen)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hänge
	Bodentyp	Braunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Rubus-, Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, (Luzula luzuloides-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2006)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne; stellenweise Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Ta	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	1
		RBu	1	2	1	2
		Kie	2	3	1	1
		Fi	1	3	2	1
	möglich (m)	BAh	2	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
		StEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Es	3	2	1	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	3,4 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,16 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de