

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]


14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Sthw



h'gelb

Buchen-Mehlbeeren-Steppenheidewald

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Trocken bis sehr trocken

in der


Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder

(Extreme, zum Teil schroffe Hangstandorte im Oberen Muschelkalk; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch natürliche Erosionskräfte meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinausgehend)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge schroffe Oberhänge
	Bodentyp	Rendzina und Kalkrohboden
	Humusform	Kalkmull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Carex montana-, Mercurialis perennis-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, Tanacetum corymbosum-, (Deschampsia flexuosa-, Urtica dioica-, Vaccinium) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2006)
	Natürliche Waldgesellschaft	Blaugras-Buchenwald; Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Mehlbeere
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Spitzahorn, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Elsbeere, Feldahorn, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	möglich (m)	TrEi	2	2	3
		StEi	2	2	3
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	2	2	3
		BAh	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Kie	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Ta	3	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3
		Fi	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	Elsbe, FAh, MeBe, SAh			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	2,2 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,02 %)			
	Kartierzeitraum	2000-09 - 47,5 %			
		1970-79 - 52,5 %			
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	7912 (StW), 9610			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de