

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

T-

Buchen-Traubeneichen-Hainbuchen-Wald auf mäßig trockenem Ton



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken (bis mäßig frisch) und trocken

oliv
d'gelbe Querstriche

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tone

(Meist tief plastizierter Ton und schluffiger Ton aus Verwitterung des Unteren Muschelkalks, des Keupers und des Lias; schluffig-lehmige Auflage bis 25/30 cm möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen ebene Lagen und Kuppen
	Bodentyp	Rendzina-Pelosol und Pelosol
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Asarum europaeum-, Carex montana-, Deschampsia flexuosa-, Mercurialis perennis-, (Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen; Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche, Hainbuche (Weißbuche)
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Spitzahorn, Vogelkirsche, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	TrEi	2	2	1	2
	möglich (m)	RBu	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		Kie	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	1	3
		BAh	2	2	2	3
		Ta	1	2	2	3
	ungeeignet (u)	Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	HBu, SAh				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	4,7 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,05 %)			
	Kartierzeitraum	vor1970	-	41,8 %	
		2010-19	-	37,4 %	
		2000-09	-	20,8 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	6907, 10026, 9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de