

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

IStWH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Steinschutt-Winterhang



satth'grün
h'grüne Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (bis mäßig trocken)

in der


Öko-Serie der lehmigen Steinschutthänge

(Flach- bis mittelgründiger, selten tiefgründiger, stark steiniger, lehmig-sandig-grusiger Hangschutt der Kristallinverwitterung, meist Gneise und Ganggesteine, meist als periglaziale Deckschuttfolge, örtlich auch lehmarm und Steinschutt oft schon im Oberboden; z.T. durch dichtgepackte Steine oder Fels im Unterboden eingengter Wurzelraum; Bohrtiefe meist weniger als 40 cm)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hanglagen
	Bodentyp	Braunerde, örtlich Ranker-Braunerde, selten podsolig
	Humusform	Mull bis Mullmoder, selten Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	stellenweise mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Luzula luzuloides-, (Deschampsia flexuosa-, Rubus-, Asarum europaeum-, Vaccinium) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne und Waldschwingel
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Dgl	2	2	1	1
		RBu	1	2	1	2
		Ta	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Fi	1	3	2	1
	möglich (m)	BAh	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	TrEi	3	2	1	3
		Kie	3	3	1	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, HBu, SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	56,9 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,59 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	75,1 %		
		1970-79	-	24,9 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10016, 10026, 7912, 10087				

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de