

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]


14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

metRH



blaßoliv
schwarze Rutschpfeile

Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf mergelig tonigem Rutschhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

meist mäßig frisch bis frisch

in der

Gruppe der Rutschhänge

(Latent bis akut rutschgefährdete steile bis schroffe, z.T. auch nur mäßig geneigte Hänge; ausgeprägt unruhige Morphologie, oft mit Rutschkissen und Hangquertälchen sowie einem Mosaik aus Kleinstandorten mit weiter Wasserhaushaltsspanne; zumindest im Untergrund immer plastisch-toniges Material, überwiegend im Braunen Jura und Keuper, seltener im Lias und Muschelkalk)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten zur Zeit beruhigte, ältere Rutschungen an mäßig steilen Hängen im Muschelkalk, Keuper und Jura
	Bodentyp	Mergelrendzina-Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Miliun effusum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, (Corydalis cava-, Rubus) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2015)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Stieleiche, Traubeneiche, Vogelkirsche, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Hasel, Salweide

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2	2
	möglich (m)	TrEi	3	2	1	2
		Ta	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	2
		Fi	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBu, SAh, SLi, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 0 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende gelegentlich/zerstreut (0,16 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de