

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wfT

Tannen-Hainbuchen-Eschen-Wald auf wechselfeuchtem Ton



oliv
schwarze Wellenlinien

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Wechselfeucht bis vernässend

in der


Öko-Serie der vernässenden Tone und Mergeltone

(Stauässegezeichneter, mehr oder weniger zähplastischer Ton und schluffiger Ton aus Verwitterung des Unteren (selten des Mittleren) Muschelkalks, des Mittleren Keupers, des Lias und des Braunen Jura, bei Mergelton-Ausbildung Karbonat Spiegel zwischen 0 und 40 cm; Schlufflehmauflage bis 25 cm möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen ebene Lagen und Hangmulden
	Bodentyp	Pelosol-Pseudogley und Pseudogley
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Rubus-, Urtica dioica-, Carex flacca-, (Juncus-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Vaccinium) - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2006 bis 2015)
	Natürliche Waldgesellschaft	Labkraut-Tannenwald; Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald mit Haselwurz; Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Hainbuche (Weißbuche), Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Rotbuche, Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		Ta	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	TrEi	2	2	1	2
		StEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		BAh	2	2	3	2
		RBu	2	2	3	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	3	2
		sonstige Laubbaumarten	Aspe, HBU, SAh, SEr			
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	16 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,2 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	50,6 %		
		2000-09	-	49,4 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 10026, 10016				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de