

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/02 Mittlere Ostalb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

580 (458 bis 679) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,1 (6,9-7,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


871 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wfDL

Buchen-Eichen-Wald auf wechselfeuchtem Decklehm



h'braun
h'grüne Querstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Wechselfeucht, örtlich vernässend

in der


Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Decklehme

(Mehr als 60 cm mächtige, meist pleistozäne, schluffige Lehme mit wechselnd deutlichen Staunässezeichen im Oberboden und mit typischem marmoriertem Unterboden, über schwer durchlässigem Untergrund (z.B. tonige Fließerde aus Bunter Breccie, toniger Ocker- oder Rotlehm); Feinsandbeimengungen und geringer Feuersteinanteil möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Parabraunerde-Pseudogley bis Pseudogley
	Humusform	Mullmoder bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Luzula luzuloides-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, (Stachys sylvatica-, Carex brizoides-, Rubus idaeus-, Vaccinium myrtillus) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2001)
	Natürliche Waldgesellschaft	selten Hainsimsen-Buchenwald mit Seegras
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Gemeine Fichte, Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	StEi	1	2	1	2
	möglich (m)	RBu	1	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	-	2	3	2
		BAh	2	2	3	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	17,5 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,15 %)				
	Kartierzeitraum	1980-89	-	61,7 %		
		1970-79	-	38,3 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_02_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_02_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_02_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	8001, 7814				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de