

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/03 Lone- und Egualb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

532 (446 bis 615) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,5 (7,3-8) Ø Temp. / Jahr [°C]

14,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


786 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

404 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KK-

Buchenwald auf trockenen Kalkkuppen und



h'gelb
d'braune Senkrechtstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Trocken

in der


Gruppe der Kuppen und Rücken

(Exponierte, teils felsige Erosionslagen (Kuppen und Rücken der Weißjura-Hochfläche, Plateausporne an Steilhangkanten und Hangrippen); meist wenig entwickelte Böden über hoch anstehendem Weißjura-Gestein und eingeschränkter Wasserhaushalt)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten exponierte Kuppen, Hangkanten und Plateausporne; flachgründig, steinig und wenig verlehmt |
| | Bodentyp | Mull-Rendzina bis Terra fusca-Rendzina, oft verhagert |
| | Humusform | Kalkmoder bis Mullmoder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| | | |

| | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|---|---|---|---------------|------------|----------|---|
| Baumarteneignung | möglich (m) | Es | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | RBu | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | TrEi | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | StEi | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | ungeeignet (u) | Dgl | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | | BAh | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Fi | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | FAh, MeBe, SLi | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | SKie | | | | |
| | Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 9,4 ha | | | |
| Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | | gelegentlich/zerstreut (0,2 %) | | | | |
| Kartierzeitraum | | 1980-89 | - | 90,8 % | | |
| | | 1970-79 | - | 9,2 % | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_03_submontan.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_03_submontan.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_03_submontan.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 8014 (RK), 7909 (RK) | | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de