

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Wuchsbezirk

6/04 Nordteil der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenrahmen [m ü. NN.]

462 bis 871 (Ø 725)

regionalisierte Klimadaten

Ø 1961-1990

Ø 1991-2020

Ø Temp. / Jahr [°C]

6,7

7,9

Ø Temp. / Sommer (Juni-Aug.) [°C]

14,7

16,2

Σ Niederschlag / Jahr [mm]

983

964


Σ Niederschlag / VZ (Mai-Sept.) [mm]

481

479

VLH+

**Bergahorn-Eschen-Buchen-Wald auf frischem
Vulkanitlehmhang**



oliv
d'grüne Schräggitter
schwarze Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Öko-Serie der Vulkanitlehmhänge

(Verwitterungsdecken von kalkreichen Tuffiten des Urach-Kirchheimer Vulkangebiets; meist stark humose, nährstoffreiche tonige Lehme bis Tone)

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standorte der Hänge |
| | Bodentyp | basenreiche Braunerde bis Pelosol |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | hoch |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | latente Rutschgefährdung |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|---|
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, Milium effusum-, Corydalis cava - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |


| | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Bergahorn, Gemeine Esche, Rotbuche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| | | |

| Baumarteneignung | Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung | | | | | |
|-------------------------|---|-----|---|---|---|---|
| | geeignet (g) | Es | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | BAh | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | Bu | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | Fi | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich (m) | Dgl | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | wenig geeignet (w) | SEi | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | Kie | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | BUI | | | | |
| sonstige Nadelbaumarten | ELä | | | | | |

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 8,4 ha. |
| | Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende | selten (0,04 %) |
| | Kartierzeitraum | 1970-79 - 100 % |

| | | |
|-----------------|--|---|
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04_montan.pdf |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04_montan.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04_montan.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 7720 |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de