

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Wuchsbezirk**

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenrahmen [m ü. NN.]

410 bis 881 (Ø 676)

regionalisierte Klimadaten

Ø 1961-1990

Ø 1991-2020

Ø Temp. / Jahr [°C]

7,1

8,3

Ø Temp. / Sommer (Juni-Aug.) [°C]

15,0

16,6

Σ Niederschlag / Jahr [mm]

1058

1045


Σ Niederschlag / VZ (Mai-Sept.) [mm]

523

524

**HMu+**

**Bergahorn-Eschen-Wald in frischen Hangmulden  
und Hangrinnen**



Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch bis mäßig frisch**

h'braun  
h'grüne Schräggitter  
d'grüne Punkte

in der

**Gruppe der Rinnen, Mulden, Senken und sonstigen konkaven Lagen**

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standorte
	<b>Bodentyp</b>	verbraunte Rendzina
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	hoch
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	latente Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Lunaria rediviva - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	25 Vegetationsaufnahmen (2005 bis 2011)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Ahorn-Eschenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Bergahorn, Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergulme, Rotbuche, Sommerlinde, Spitzahorn
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Salweide

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	1
		Bu	2	2	2	2
		Fi	2	2	3	1
	wenig geeignet (w)	TEi	3	2	2	2
		Kie	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, Kir, SAh, SLi				
sonstige Nadelbaumarten	Eb					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	476 ha.
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (2,67 %)
	Kartierzeitraum	vor1970 - 0 %
		2010-19 - 39,5 %
		2000-09 - 7,8 %
		1990-99 - 7,4 %
		1980-89 - 18,6 %
		1970-79 - 26,6 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf</a>
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf</a>
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf</a>
	Zugehörige Kartierobjekte	10028, 7903 (WRi), 8019 (WRi), 7723 (WjRi), 9729, 9407 (WRi), 8216 (WRi), 7301 (a), 6215 (Ri)

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)