

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSRH



Buchenwald auf Kalkschutt-Rutschhang

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, an exponierten Stellen bis mäßig trocken

blaßd'braun
schwarze Rutschpfeile

in der

Gruppe der Rutschhänge

(Quellig-feuchte bis wechsellrockene, meist noch bewegte oder erkennbar noch nicht beruhigte Hangpartien mit wechselnder Neigung und einem Mosaik von Kleinstandorten, im Grenzbereich Weißjura/Braunjura; meist Tone, Mergeltone und rohe Tonmergel mit wechselhaftem Kalksteinhangschutt-Anteil)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten zur Zeit beruhigte zungenförmige und schollenartige Rutschmassen mit mindestens 40 cm, meist mehr als metermächtigem Rendzina-artigem Kalksteinschutt des Weißjura beta (und alpha)
	Bodentyp	Rendzina, örtlich bis Terra fusca-Rendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Milium effusum-, Hordelymus europaeus-, Stachys sylvatica-, Ajuga reptans-, Silene nutans-, Carex flacca-, Urtica dioica - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2011)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Sommerlinde; Waldgersten-Buchenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Feldahorn, Gemeine Esche, Sommerlinde, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	1	2
		Dgl	2	2	3	2
		TrEi	3	2	1	3
		Kie	3	2	2	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, FAh, SAh, SLi, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe, ELä					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	19,4 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,11 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	51,3 %		
		2000-09	-	48,7 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10028, 9729				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de