

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Wuchsbezirk

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenrahmen [m ü. NN.]

410 bis 881 (Ø 676)

regionalisierte Klimadaten

Ø 1961-1990

Ø 1991-2020

Ø Temp. / Jahr [°C]

7,1

8,3

Ø Temp. / Sommer (Juni-Aug.) [°C]

15,0

16,6

Σ Niederschlag / Jahr [mm]

1058


1045

Σ Niederschlag / VZ (Mai-Sept.) [mm]

523

524

KSih



weiß

blaue Schräggitter

Buchen-Eschen-Wald auf Kalk-Sinterhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Quellig

in der

Gruppe der Sinter- und Kalktuffhänge

(± quellige Hangpartien im Bereich des Weißjura alpha bis - delta mit (holozäner) Kalktuffbildung, teils dünne Kalksinterauflagen über Ton und Mergelton)


| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standorte der Hänge |
| | Bodentyp | (nasse) Rendzina bis Quellengley (aus mergeligem, oberflächlich versintertem Ton) |
| | Humusform | Kalkmoder |
| | Basenausstattung | hoch |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | keine Eingabe |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Impatiens noli-tangere-, Ajuga reptans-, Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Hordelymus europaeus-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica - Gruppe |
| | Aufnahmen | 3 Vegetationsaufnahmen (2011) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Riesenschachtelhalm-Eschenwald |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Gemeine Esche |
| | Nebenbaumart(en) | Bergahorn, Bergulme, Schwarzerle (Roterle), Stieleiche |
| | Pionierbaumart(en) | Salweide, Sandbirke (Hängebirke) |

| Baumarteneignung | Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung | | | | | |
|------------------|---|--------------------|---|---|---|---|
| | geeignet (g) | Es | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | möglich (m) | BAh | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Bu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Kie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | wenig- bis ungeeignet (w/u) | TEi | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | ungeeignet (u) | Dgl | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | | Fi | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | BUI, HBU, SEi, SLi | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | Eb | | | | |

| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 8,7 ha. |
|-----------|---|-----------------|
| | Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende | selten (0,05 %) |
| | Kartierzeitraum | 2010-19 - 100 % |

| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf |
|-----------------|--|---|
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 10028 |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de