

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeTH+

Buchen-Eschen-Bergulmen-Wald auf frischem Mergeltonhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Frühjahrsfrisch bis frisch

oliv
d'grüne Schräggitter
h'grüne Punkte

in der


Öko-Serie der Mergeltonhänge

(Flache bis mäßig steile Hänge im Übergangsbereich Weißjura alpha zum Oberen Braunjura oder im Weißjura gamma; häufig unruhige, kleinmuldige Oberflächenformen; humoser Mergelton, 30 cm, teilweise auch mehr, deutlich plastiziert, i.d.R. geringer Anteil an Weißjura-Kalksteinschutt, Kalkspiegel in 5 bis 30 cm Tiefe; Tendenz zur Sickerhemmung, Rutschgefährdung)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist flachere, überwiegend schattseitige Unterhänge und Hangmulden
	Bodentyp	Rendzina-Pelosol bis Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Stachys sylvatica-, Ajuga reptans-, Hordelymus europaeus-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Waldziest
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Hainbuche (Weißbuche)
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	2	2
		RBu	1	2	2
	möglich (m)	TrEi	3	2	1
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	-	-	-
		Fi	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, StEi, VKir			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	32,6 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,18 %)			
	Kartierzeitraum	2000-09	-	16,1 %	
		1990-99	-	35,5 %	
		1980-89	-	48,4 %	
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	8407, 9407, 9729			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de