

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

RHB

Eschen-Bergahorn-Bergulmen-Wald auf Rutschhang in Bewegung



oliv
blaue Rutschpfeile

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Quellig-feucht

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Quellig-feuchte bis wechsellrockene, meist noch bewegte oder erkennbar noch nicht beruhigte Hangpartien mit wechselnder Neigung und einem Mosaik von Kleinstandorten, im Grenzbereich Weißjura/Braunjura; meist Tone, Mergeltonne und rohe Tonmergel mit wechselhaftem Kalksteinhangschutt-Anteil)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Hänge wechselnder Neigung mit schuttreichen Mergelböden und einem Mosaik von Kleinstandorten im Grenzbereich Braunjura/Weißjura
	Bodentyp	Bodentypenmosaik von Rohboden über Rendzina-Pelosol bis Braunerde-Pelosol
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	akute Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Carex flacca-, Ajuga reptans-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Mercurialis perennis - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Schwarzerle (Roterle), Sommerlinde, Spitzahorn, Stieleiche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Mehlbeere, Salweide, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	2
		BAh	1	2	2
	möglich (m)	TrEi	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3
		RBu	2	2	3
		Kie	3	2	2
	ungeeignet (u)	Fi	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBu, SEr, StEi, SWei			
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	42,5 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,24 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	20 %	
		1990-99	-	7 %	
		1980-89	-	6,6 %	
	1970-79	-	66,4 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	7301 (hR), 10028, 7903 (qRH), 7723 (RH), 9407 (qRH), 8407 (qRH)			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de