

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Regionale Einheit**

6/06 Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

844 (653 bis 984) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,1 (5,7-6,7) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,6 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

995 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

490 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**BFH**



d'gelb  
schwarze Dreiecke ausgefüllt

**Berg- und Felssturzhang (nicht typisch)**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken bis mäßig frisch**

in der

**Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhänge**

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch natürliche Erosionskräfte meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Morphologie und Boden</b>       | <b>Morphologische Beschreibung</b> | Standortseinheiten der Hänge steile Blockschutthänge mit größeren, aus höheren Lagen abgerutschten Felsbrocken |
|                                    | <b>Bodentyp</b>                    | Rendzina bis Terra fusca (aus grobem, teils mäßig, teils stärker verlehmtm Kalk-Blockschutt)                   |
|                                    | <b>Humusform</b>                   | Mull bis Kalkmoder   |
|                                    | <b>Basenausstattung</b>            | keine Eingabe  |
|                                    | <b>Podsoligkeit</b>                | ohne Podsoligkeitsmerkmale   |
|                                    | <b>Rutschgefährdung</b>            | Rutschhang in Ruhe   |
| <b>Vegetation</b>                  | <b>Ökologische Artengruppen</b>    |  |
|                                    | <b>Aufnahmen</b>                   | keine Vegetationsaufnahmen   |
|                                    | <b>Natürliche Waldgesellschaft</b> | Blaugras-Buchenwald; Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald  |
| <b>Baumarten des Standortswald</b> | <b>Hauptbaumart(en)</b>            |  |
|                                    | <b>Nebenbaumart(en)</b>            |  |
|                                    | <b>Pionierbaumart(en)</b>          |  |
|                                    |                                    |  |

|                         |  | Konkurrenzkraft   | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung |   |
|-------------------------|--|---|---------------|------------|----------|---|
| <b>Baumarteneignung</b> | möglich (m)  | Es  | 1             | 2          | 1        | 3 |
|                         |  | BAh   | 1             | 2          | 1        | 3 |
|                         |  | RBu   | 2             | 2          | 1        | 3 |
|                         | wenig geeignet (w)                                       | Kie   | 3             | 2          | 2        | 2 |
|                         | wenig- bis ungeeignet (w/u)                              | Ta  | 2             | 2          | 2        | 3 |
|                         |  | Fi  | 2             | 2          | 2        | 3 |
|                         | ungeeignet (u)   | Dgl   | 3             | 2          | 3        | 2 |
|                         | sonstige Laubbaumarten                                   | BUI, FAh, MeBe, SAh, SLi, StEi  |               |            |          |   |
|                         | sonstige Nadelbaumarten                                  | Eibe  |               |            |          |   |
| <b>Vorkommen</b>        | Fläche der Standortseinheit                              | 4,2 ha  |               |            |          |   |
|                         | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | sehr selten (0,03 %)  |               |            |          |   |
|                         | Kartierzeitraum  | 1970-79 - 100 %   |               |            |          |   |
| <b>Organisatorisch</b>  | Link zur Regionallegende                                 | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf</a>       |               |            |          |   |
|                         | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung               | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf</a>   |               |            |          |   |
|                         | Link zur Vegetationsgruppierung                          | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf</a> |               |            |          |   |
|                         | Zugehörige Kartierobjekte                                | 7516  |               |            |          |   |

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)