

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Regionale Einheit**

6/06 Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

844 (653 bis 984) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,1 (5,7-6,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,6 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

995 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

490 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**BW-**

**Trockener Sommerlinden-Spitzahorn-Eschen-Bergwald**



d'gelb

d'braune Schräggitter

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Trocken bis mäßig trocken**

in der

**Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhängen**

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch natürliche Erosionskräfte meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinausgehend)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der Hänge meist sonnseitige Steilhänge mit bewegtem Steinschutt
	<b>Bodentyp</b>	Rohboden bis Mullrendzina
	<b>Humusform</b>	Mull bis Kalkmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	latente Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Tanacetum corymbosum-, Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Milium effusum - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	5 Vegetationsaufnahmen (1998 bis 2019)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Spitzahorn-Sommerlindenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Sommerlinde, Spitzahorn, Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergahorn, Bergulme, Eibe, Feldahorn, Hainbuche (Weißbuche), Mehlbeere, Rotbuche, Vogelbeere (Eberesche)
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Hasel

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	3
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	2	3
		RBu	2	2	3	3
		Kie	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	41,3 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	gelegentlich/zerstreut (0,25 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19 - 9,9 %
		2000-09 - 74,8 %
		1990-99 - 5,1 %
	1970-79 - 10,1 %	

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	9305, 7516 (BW), 9963, 10009, 9706, 9104, 10014

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)