

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06 Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

844 (653 bis 984) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,1 (5,7-6,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,6 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


995 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

490 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KK-

Buchenwald auf mäßig trockenen Kalkkuppen und Rücken



h'gelb

d'braune Senkrechtstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Trocken bis mäßig trocken

in der

Gruppe der Kuppen und Rücken

(Exponierte, teils felsige Erosionslagen (Kuppen und Rücken der Weißjura-Hochfläche, Plateausporne an Steilhangkanten und Hangrippen); meist wenig entwickelte Böden über oberflächennah anstehendem Weißjura-Gestein und eingeschränkter Wasserhaushalt)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten exponierte, teils felsige Kuppen und Rücken auf der Weißjura-Hochfläche oder an Steilhangkanten und Hangrippen
	Bodentyp	Rendzina, selten (flachgründige) Terra fusca
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Asarum europaeum-, Hordelymus europaeus-, Deschampsia flexuosa-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Silene nutans-, Carex flacca-, Rubus - Gruppe
	Aufnahmen	28 Vegetationsaufnahmen (2007 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald (typisch); Seggen-Buchenwald; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Maiglöckchen
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Feldahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Sommerlinde, Spitzahorn, Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	RBu	1	2	1	3
		Kie	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	2	3
		BAh	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Ta	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SAh, SLi, StEi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	185 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,12 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	49,1 %	
		2000-09	-	35 %	
		1990-99	-	8,2 %	
	1970-79	-	7,7 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	10014, 9706, 9963, 9104 (RK), 10009, 7516 (RK), 7808 (RK), 9975, 9411 (RK), 10008, 9727, 7910 (RK)			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de