

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06 Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

844 (653 bis 984) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,1 (5,7-6,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,6 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


995 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

490 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KUH-

**Buchenwald auf mäßig trockenem
Kalkschuttunterhang**



Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken (bis trocken)

blaßd'braun
d'braune Schräggitter
d'braune Senkrechtstrichelung

in der


Öko-Serie der Kalkschuttunterhänge

(Flache bis mäßig steile Unterhänge aus Weißjura-Scherbenschlutt (Bergkies) mit Übersteilungen, Hangterrassen, Rutschkissen und Hangquertälchen infolge von Rutschungen; im Untergrund Weißjura-Mergel oder Tone des oberen Braunjura; Schuttauflage i.d.R. 40 cm und mehr; häufig freier Kalk bis zur Oberfläche; oft enge Verzahnung mit Mergel-/Mergeltonhängen; auch Ausprägungen mit mehr als 20 cm KVL-artigem Oberboden)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist konvexe, sonnseitige Unterhanglagen der Weißjura-Steilhänge, steil und stark steinig
	Bodentyp	Rendzina
	Humusform	Mull, nach Beweidung auch Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Miliium effusum-, Asarum europaeum-, Silene nutans-, Hordelymus europaeus-, (Ajuga reptans-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Sommerlinde; Waldgersten-Buchenwald mit Maiglöckchen
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche, Sommerlinde, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Bergahorn, Mehlbeere, Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2
	möglich (m)	Es	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3
		BAh	2	2	2
		Kie	3	2	2
		Ta	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Fi	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	SAh, SLi, VKir			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
	Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	16,9 ha		
Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende		gelegentlich/zerstreut (0,1 %)			
Kartierzeitraum		2010-19	-	23,3 %	
		1970-79	-	76,7 %	
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	7516, 10009			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de