

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06 Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

844 (653 bis 984) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,1 (5,7-6,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,6 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


995 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

490 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeH+

Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem Mergelhang



oliv
d'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis hangfrisch

in der


Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Wenig bis mäßig plastizierte mergelige Verwitterungsdecken des Weißjura-gamma (und -zeta) sowie Hangfließerden aus Weißjura-alpha über Oberem Braunjura; oft Vermengung mit Scherbenschutt des Weißjura-beta; stark kalkig bis zur Oberfläche, höchstens 30 cm tief entkarbonatisiert; großteils mit Oberbodenstörung durch ehemalige Beweidung)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist schattseitige Hänge
	Bodentyp	Mergelrendzina-Terra fusca, Rendzina-Pelosol, Pelosol-Braunerde (aus mittel- bis tiefgründigem Tonmergel)
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Asarum europaeum-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Hordelymus europaeus-, Rubus - Gruppe
	Aufnahmen	9 Vegetationsaufnahmen (2007 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Waldziest; stellenweise Waldgersten-Buchenwald (typisch); stellenweise Ahorn-Eschenwald; stellenweise Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Eibe
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	53,4 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,32 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	22,2 %		
		2000-09	-	5,2 %		
		1970-79	-	72,6 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7516 (MSchH), 10014, 10009, 9305				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de