

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06 Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

844 (653 bis 984) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

6,1 Ø Temp. / Jahr [°C]

12,6 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

995 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

490 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Rü-



Buchenwald auf Rücken und Hangrücken

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe Mäßig trocken und trocken, selten mäßig frisch

d'gelb
h'grüne Senkrechtstriche

in der


Gruppe der Kuppen und Rücken

(Exponierte, teils felsige Erosionslagen (Kuppen und Rücken der Weißjura-Hochfläche, Plateausporne an Steilhangkanten und Hangrippen); meist wenig entwickelte Böden über oberflächennah anstehendem Weißjura-Gestein und eingeschränkter Wasserhaushalt)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rücken und Hangrücken, meist im Bereich der Weißjura-Steilhänge, oft mit anstehendem Fels und oberflächennahem Kalkspiegel
	Bodentyp	Rendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Silene nutans-, Asarum europaeum-, Rubus-, Urtica dioica-, (Teucrium chamaedrys-, Centaurea montana) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2008 bis 2009)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Maiglöckchen; Seggen-Buchenwald (typisch); stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Sommerlinde; stellenweise Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Sommerlinde, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	möglich (m)	Kie	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	Es	1	2	1	3
		RBu	1	2	1	3
	möglich bis weniger geeignet (m/w)	BAh	2	2	2	3
	weniger- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	2
	ungeeignet (u)	Ta	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	16,9 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,1 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	69 %		
		2000-09	-	31 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10014, 9305				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de