

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BFH



d'gelb
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

Unbestockter Bergsturz- und Felshang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken bis mäßig frisch

in der

Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhängen

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch (natürliche) Erosion meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge steile Blockschutthänge mit größeren, aus höheren Lagen abgerutschten Felsbrocken und blockreichen Schollen
	Bodentyp	Rendzina bis Terra fusca (aus grobem, teils mäßig, teils stärker verlehmtm Kalk-Blockschutt)
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Tanacetum corymbosum-, Ajuga reptans-, Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Mehlbeer-Bergahorn-Steinschutthangwald; Block-Fichtenwald; Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald; Blaugras-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Eibe, Feldahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Salweide, Sommerlinde, Spitzahorn, Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	3
		RBu	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	2	2
		Kie	3	2	2	2
		Ta	2	2	2	3
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, FAh, MeBe, SAh, SLi				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	54,8 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,5 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 4,2 %
		2000-09 - 46,5 %
		1970-79 - 49,3 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9728, 7516 (StzH), 7218, 10008, 10014

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de