

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BFWH



Bergsturz- und Fels-Winterhang

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

überwiegend mäßig frisch bis frisch, stellenweise mäßig trocken, kleinflächig stark wechselnd

h'grün
schwarze Dreiecke ausgefüllt

in der

Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhängen

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch (natürliche) Erosion meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge schattseitige Bergsturzgelände mit großen Blöcken und grobem Hangschutt
	Bodentyp	Rendzina bis Terra fusca (aus grobem, teils mäßig, teils stärker verlehmtm Kalk-Blockschutt)
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, Deschampsia flexuosa-, (Urtica dioica-, Hordelymus europaeus) - Gruppe
	Aufnahmen	9 Vegetationsaufnahmen (1996 bis 2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Mehlbeer-Bergahorn-Steinschutthangwald; Block-Fichtenwald; stellenweise Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; stellenweise Blaugras-Buchenwald; stellenweise Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen
arten des ortswald	Hauptbaumart(en)	
	Nebenbaumart(en)	Weißtanne

Baumstand	Pionierbaumart(en) Bergahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Salweide, Sommerlinde, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Ta	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		Kie	3	2	2	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, FAh, MeBe, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe, ELä				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	59,2 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,54 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 14,8 %
		2000-09 - 85,2 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9728, 10008, 9727, 10014, 9729, 9305, 10009

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de