

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

HMu+

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald in frischen Hangmulden



h'braun
h'grüne Schräggitter
d'grüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis mäßig frisch

in der

Gruppe der Rinnen, Mulden, Senken und sonstigen konkaven Lagen

(Rinnen, Mulden, Senken und Hangrinnen im Bereich des Weißjura, selten auch breitere Talsohlen; teils ± steinschuttgeprägt, teils unterschiedlich tief lehmgefüllt mit wechselndem Kalkspiegel und unterschiedlichem Wasserhaushalt)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten breite Hangmulden unterschiedlicher Exposition in Weißjura-Steilhängen
	Bodentyp	Rendzina bis Terra fusca
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Urtica dioica-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2005 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Waldziest; Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald (typisch); stellenweise Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald; stellenweise Ahorn-Eschenwald; stellenweise Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald mit Waldziest; selten
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Gemeine Esche, Sommerlinde, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	
		BAh	1	2	1	
		RBu	1	2	1	
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	2	2	1	
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	
		Fi	2	2	3	
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SLi, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	27,3 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,25 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	29 %		
		2000-09	-	71 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10014, 9727, 9729, 9619, 9305				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de