

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KK-

Buchen-Mehlbeeren-Sommerlinden-Wald auf mäßig trockenen Kalkkuppen und Rücken



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Trocken bis mäßig trocken

h'gelb
d'braune Senkrechtstriche

in der

Gruppe der Kuppen und Rücken

(Exponierte, teils felsige Kuppen und Rücken der Weißjura-Hochfläche, Plateausporne an Steilhangkanten und Hangrippen; meist wenig entwickelte Böden über (hoch) anstehendem Weißjura-Gestein, deutlich eingeschränkter Wasserhaushalt)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten exponierte, teils felsige Kuppen und Rücken auf der Weißjura-Hochfläche oder an Steilhangkanten und Hangrippen
	Bodentyp	Rendzina, selten (flachgründige) Terra fusca
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Silene nutans-, Tanacetum corymbosum-, (Asarum europaeum-, Deschampsia flexuosa-, Carex alba) - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2007 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald mit Tanne (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Mehlbeere, Sommerlinde
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Spitzahorn, Stieleiche, Traubeneiche, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	Kie	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	Es	1	2	1	3
		RBu	1	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	2
		Ta	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SAh, SLi, StEi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	13,9 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,13 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 20,7 %
		2000-09 - 36,3 %
		1970-79 - 43 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7516 (KK), 10014, 9727, 9729, 10008, 10009

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de