

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KL-

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Kalklehm



sattl'braun
d'braune Querstriche
schwarze Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Serie der humosen Kalklehme

(Mittel- bis tiefgründige, oft über 60 cm mächtige, mehr als 30 cm humose, dunkelbraune, schluffige, örtlich leicht feinsandige, nach unten etwas tonige Lehme, auch Kalkverwitterungslehme, im Unterboden zunehmend steinig, meist im oberen Abschnitt der Weißjura beta-Verebnung)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen der Weißjura-Beta-Verebnung, 20 - 30 cm steinfreier humoser Lehm
	Bodentyp	humose Rendzina bis humose Braunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
	Vegetation	Ökologische Artengruppen
Aufnahmen		2 Vegetationsaufnahmen (2019)
Natürliche Waldgesellschaft		Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Sommerlinde, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	Dgl	2	2	1	2
		Kie	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	2	2	1	3
		BAh	2	2	1	3
	wenig geeignet (w)	Ta	2	2	2	3
		Fi	2	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	SAh, SLi, StEi, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	17,8 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,16 %)			
	Kartierzeitraum	vor1970	-	10,8 %	
		2010-19	-	34,8 %	
		1970-79	-	54,4 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7218, 10014, 6410, 6316

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de