

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSRH



blaßd'braun
schwarze Rutschpfeile

Buchen-Tannen-Wald auf Kalkschutt-Rutschhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch, örtlich frisch, an
exponierten Stellen auch mäßig trocken**

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Unruhige, teils in Bewegung befindliche Hangpartien im Braunjura und Weißjura alpha; meist Tone und rohe Tonmergel; Mosaik von Kleinstandorten)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten zur Zeit beruhigte zungenförmige und schollenartige Rutschmassen mit mindestens 40 cm, meist mehr als metermächtigem Rendzina-artigem Kalksteinschutt des Weißjura beta (und alpha)
	Bodentyp	Rendzina, örtlich bis Terra fusca-Rendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Asarum europaeum-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Hordelymus europaeus-, Rubus-, Carex flacca - Gruppe
	Aufnahmen	18 Vegetationsaufnahmen (2005 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch); Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch); Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen; selten Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Sommerlinde; selte
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Eibe, Feldahorn, Gemeine Esche, Sommerlinde, Spitzahorn, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

E S		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	2	2	1	2
	möglich (m)	RBu	1	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	3	2	2	2
		Kie	3	2	2	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	241,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (2,21 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	8,7 %		
		2000-09	-	91,3 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9728, 10008, 9727, 10014, 9729, 10009				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de