

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSih



weiß
blaue Schräggitter

Buchen-Eschen-Wald auf Kalk-Sinterhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Quellig

in der

Gruppe der Sinter- und Kalktuffhänge


(± quellige Hangpartien im Bereich des Weißjura alpha und des (Oberen) Braunjura mit (holozäner) Kalktuffbildung, teils dünne Kalksinterauflagen über Ton und Mergelton)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Hanglagen im Braunjura und Weißjura alpha mit Kalktuffbildung; Kernzonen gelegentlich unbestockt
	Bodentyp	(nasse) Rendzina bis Quellengley (aus mergeligem, oberflächlich versintertem Ton)
	Humusform	Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Impatiens noli-tangere-, Ajuga reptans-, Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, Rubus - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Ahorn-Eschenwald; Riesenschachtelhalm-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Schwarzerle (Roterle), Stieleiche, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere, Salweide, Sandbirke (Hängebirke)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
	möglich (m)	BAh	2	2	2	2
		RBu	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	2	2	2
		Ta	2	2	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, MeBe, SAh, SLi, StEi				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	3,8 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,03 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 13,8 %
		2000-09 - 52,7 %
		1970-79 - 33,5 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9727, 7516 (SiH), 10014

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de