

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TH+

Eschen-Tannen-Bergulmen-Wald auf frischem Braunjura-Tonhang



oliv
d'grüne Schräggitter
d'grüne Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch, z.T. feucht

in der


Öko-Serie der Tonhänge im Braunjura

(In der Regel mehr als 40 cm plastizierter und entkalkter, steinarmen Ton und schluffiger Ton aus Ton- und Tonmergelverwitterung des Braunjura; flache bis steilere Hänge oft mit unruhiger Morphologie aufgrund von Rutschungen (kurze Übersteilungen, Hangterrassen/Rutschkissen, Hangquertälchen); örtlich auch freier Kalk bis zur Oberfläche)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge konkave Hangformen am Unterhang und breite Hangmulden
	Bodentyp	Pelosol bis Braunerde-Pelosol, selten Rendzina-Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Milium effusum-, Asarum europaeum - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (1996)
	Natürliche Waldgesellschaft	Ahorn-Eschenwald mit Hängesegge; Ahorn-Eschenwald mit Bärlauch; Ahorn-Eschenwald (typisch); selten Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Waldziest
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Weißtanne, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Rotbuche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	2	1	
		Ta	2	2	1	
	möglich (m)	RBu	2	2	1	
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	
		Kie	3	2	2	
		Fi	2	2	3	
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	23,6 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,22 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9305, 10008, 9942				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de