

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Braunjura-Tonhang



oliv
h'grüne Schräggitter
h'grüne Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Tonhänge im Braunjura

(In der Regel mehr als 40 cm plastizierter und entkalkter, steinarmen Ton und schluffiger Ton aus Ton- und Tonmergelverwitterung des Braunjura; flache bis steilere Hänge oft mit unruhiger Morphologie aufgrund von Rutschungen (kurze Übersteilungen, Hangterrassen/Rutschkissen, Hangquertälchen); örtlich auch freier Kalk bis zur Oberfläche)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Mittel- und Unterhanglagen
	Bodentyp	Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Asarum europaeum-, Ajuga reptans-, Rubus-, Stachys sylvatica-, (Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	14 Vegetationsaufnahmen (2007 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald (typisch); Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch); selten Waldmeister-Buchenwald mit Tanne (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Sommerlinde
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere, Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
		RBu	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		Fi	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	161 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,47 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 4,3 %
		2000-09 - 82,5 %
		1970-79 - 13,2 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9305, 10008, 9619, 7808 (mfrTH), 10014, 9728, 9942

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de