

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TLH

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf mäßig frischem Braunjura-Tonlehmhang



h'grün
h'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (bis frisch)

in der

Öko-Serie der Tonlehmhänge im Braunjura

(Mehr als 40 cm ± toniger, schluffiger Lehm mit wechselndem, i.a. geringem bis mäßigem Steingehalt, meist Weißjura-Kalksteinhangschutt, mit allmählichem Übergang zum zähen Ton des Unterbodens, aus Verwitterung des (Oberen) Braunjuras; häufig unruhige Morphologie aufgrund von beruhigten Rutschungen, jedoch Rutschgefahr)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge mäßig steile bis steile Hanglagen, oft unruhig geformt
	Bodentyp	Parabraunerde-Braunerde bis Braunerde-Pelosol
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Rubus-, Hordelymus europaeus-, (Deschampsia flexuosa-, Impatiens noli-tangere-, Carex flacca) - Gruppe
	Aufnahmen	32 Vegetationsaufnahmen (1996 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch); Waldmeister-Buchenwald mit Tanne (typisch); Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald (typisch); selten Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Waldziest; selten Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald mit Waldziest
umarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche


Ba St

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
		Fi	1	2	2	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	2	1
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	1	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe, ELä					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	476,2 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (4,36 %)
	Kartierzeitraum	vor1970 - 1,7 %
		2010-19 - 2,5 %
		2000-09 - 51,8 %
		1970-79 - 44 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7218, 9728, 10008, 7516, 9305, 9727, 7808 (mfrTLH), 10009, 6410 (LH+), 9729, 9619, 9942

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de