

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

tIKUH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem tonig-lehmigem Kalkschuttunterhang



blaßd'braun
h'grüne Schräggitter
h'grüne Querstrichelung

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Kalkschuttunterhänge

(Flache bis mäßig steile Unterhänge aus Weißjura- (Kalkstein-) Scherbenschutt (Bergkies) mit Übersteilungen, Hangterrassen, Rutschkissen und Hangquertälchen infolge von Rutschungen; im Untergrund Weißjura-Mergel oder Tone des Oberen Braunjura; häufig Quellaustritte am Beginn der Mergelschichten; Schuttauflage i.d.R. 40 cm und mehr; häufig freier Kalk bis zur Oberfläche; auch Ausprägungen mit mehr als 20 cm KVL-artigem Oberboden; oft enge Verzahnung mit Mergel- und Mergeltonhängen)

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der Hänge Unterhanglagen der Weißjura-Steilhänge; entkalkte, tonig-lehmige (KVL-artige) Auflage von mehr als (20)/25 cm |
| | Bodentyp | Rendzina-Terra fusca bis Terra fusca-Braunerde |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Rutschhang in Ruhe |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Milium effusum-, Asarum europaeum-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Hordelymus europaeus-, Carex flacca-, (Stachys sylvatica) - Gruppe |
| | Aufnahmen | 7 Vegetationsaufnahmen (2005 bis 2019) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald (typisch) |
| arten des dortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Weißtanne |
| | Nebenbaumart(en) | Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche |
| | Pionierbaumart(en) | Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche) |


| | |
|---------------------|--|
| Bau Star | |
|---------------------|--|

| Baumarteneignung | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
| | geeignet (g) | RBu | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich (m) | Es | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | BAh | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | Ta | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Dgl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Fi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | wenig geeignet (w) | Kie | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | VKir | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 24,1 ha |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,22 %) |
| | Kartierzeitraum | 2000-09 - 100 % |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 9729 |

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de