

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/07 Baaralb und Randen

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

805 (534 bis 973) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,6 (5,8-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


914 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

447 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BW-

Trockener Spitzahorn-Sommerlinden-Bergwald



d'gelb

d'braune Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Trocken bis mäßig trocken

in der

Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch natürliche Erosionskräfte meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten meist sonnseitige Steilhänge mit bewegtem Steinschutt
	Bodentyp	Rohboden bis Mullrendzina
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Mercurialis perennis-, Sesleria albicans-, Tanacetum corymbosum-, Pyrola-, Urtica dioica-, (Lunaria rediviva-, Luzula luzuloides-, Milium effusum) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2005)
	Natürliche Waldgesellschaft	Spitzahorn-Sommerlindenwald; stellenweise Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald mit Mondviole
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Spitzahorn, Sommerlinde
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Feldahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Rotbuche
	Pionierbaumart(en)	Hasel

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	3
		BAh	1	2	1	3
	wenig geeignet (w)	RBu	2	2	3	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, MeBe, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	4,5 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,03 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 37,8 %
		2000-09 - 62,2 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_07_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_07_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_07_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 10055, 10056

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de