

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/07 Baaralb und Randen

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

805 (534 bis 973) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,6 (5,8-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

914 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

447 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

WJH=



h'braun

d'braune Schräggitter

d'gelbe Punkte

Buchenwald auf trockenem Weißjura-Steilhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Trocken

in der

Öko-Serie der Weißjura-Steilhänge

(Steile Tal- und Rinneneinhänge (über 30 % Hangneigung) mit meist lockeren, rendzinaartigen, ± steinigen, flach- bis mittelgründigen Hangschuttböden der Weißjura-Kalksteinverwitterung, überwiegend Weißjura beta, Hangschutt oft Bergkies, teilweise mergeliger Untergrund (z.T. ab 40 cm Tiefe); i.d.R. oberflächennaher Kalkspiegel, Verlehmmungsmaß wechselnd)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge steile, sonnseitige und sonst exponierte Hänge
	Bodentyp	Rendzina bis Rohboden
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Silene nutans-, Milium effusum-, Carex flacca-, (Asarum europaeum-, Hordelymus europaeus-, Rubus) - Gruppe
	Aufnahmen	7 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2015)
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald; stellenweise Blaugras-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Feldahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Mehlbeere, Sommerlinde, Spitzahorn, Stieleiche, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	Kie	2	2	1	3
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	Es	1	2	1	3
		RBu	1	2	1	3
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Ta	2	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SLi, StEi				
sonstige Nadelbaumarten	SKie					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	32,6 ha			
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,24 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	59,7 %	
		2000-09	-	40,3 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_07_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_07_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_07_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 10055, 10056			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de