

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/08 Südwestliche Donaulalb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

741 (566 bis 897) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,7 (6,2-7,3) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

888 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

450 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BFH



d'gelb
schwarze Dreiecke ausgefüllt

Berg- und Felssturzhang (nicht typisch)

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken bis mäßig frisch

in der


Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhänge

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch natürliche Erosionskräfte meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten steile Hänge mit größeren, wirgelagerten Blöcken und Schuttmassen alter und jüngerer Bergstürze und Schroffelsen; sehr unruhigen Geländeformen, oft auch mit kleinen Hangterrassen; weitgespanntes Wasse
	Bodentyp	Syrosem-Rendzina bis Rendzina, seltener Terra fusca
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Miliun effusum-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Silene nutans-, Stachys sylvatica-, Tanacetum corymbosum-, Carex flacca-, Ajuga reptans-, Deschampsia flexuosa - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (1999)
	Natürliche Waldgesellschaft	Blaugras-Buchenwald; Spitzahorn-Sommerlindenwald; Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	sonstige Laubbaumarten	-
	sonstige Nadelbaumarten	-
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	2,3 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,01 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_08_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_08_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_08_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9305

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de