

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/08 Südwestliche Donaulalb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

741 (566 bis 897) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,7 (6,2-7,3) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

888 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

450 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BW+



d'gelb
d'grüne Schräggitter

Frischer Eschen-Bergahorn-Bergulmen-Bergwald

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhänge

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch natürliche Erosionskräfte meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Steilhänge aus bewegtem Steinschutt, überwiegend in Schattlage, z.T. felsig
	Bodentyp	Rendzina, z.T. Braunerde-Rendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Corydalis cava-, Stachys sylvatica-, Lunaria rediviva - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (1998)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; selten Waldgersten-Buchenwald mit Sommerlinde
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Eibe, Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Sommerlinde, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	wenig geeignet (w)	RBu	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	StEi	3	2	2	3
		Kie	3	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Ta	3	2	3	2
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	77,5 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,47 %)			
	Kartierzeitraum	2000-09	-	60,8 %	
		1990-99	-	29,9 %	
		1970-79	-	9,3 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_08_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_08_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_08_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9305, 9411, 7314, 9706, 9104, 9909, 7216, 9955

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de