

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/08 Südwestliche Donaualb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

741 (566 bis 897) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,7 (6,2-7,3) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

888 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

450 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BW-

Trockener Spitzahorn-Sommerlinden-Bergwald



d'gelb

d'braune Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

trocken bis mäßig trocken

in der

Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhängen

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch natürliche Erosionskräfte meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten sonenseitige, steile Hänge aus bewegtem Steinschutt
	Bodentyp	Rohboden, Syrosem-Rendzina bis Rendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Tanacetum corymbosum-, Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Milium effusum-, Carex flacca - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2000)
	Natürliche Waldgesellschaft	Spitzahorn-Sommerlindenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Spitzahorn, Sommerlinde
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Eibe, Feldahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Mehlbeere, Rotbuche, Vogelbeere (Eberesche)
	Pionierbaumart(en)	Hasel

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	Es	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	2	3
		RBu	2	2	3	3
		StEi	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SAh, SLi				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	133 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,79 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 50,6 %
		1990-99 - 49,4 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_08_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_08_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_08_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9305, 9411, 9909, 9104, 9706, 9955

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de