

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Regionale Einheit**

6/08 Südwestliche Donaulalb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

741 (566 bis 897) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,7 (6,2-7,3) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


888 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

450 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeH=

**Buchen-Stieleichen-Wald auf trockenem Rohmergelhang**



h'gelb  
olive Schräggitter  
olive Punkte

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Trocken**

in der

**Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge**

(Meist gering entwickelte, kleinsteinige, schluffig-tonige Mergelverwitterungsböden des Weißjura zeta 2; flache bis mäßig steile Hänge, je nach Gründigkeit plastiziert (0 bis höchstens etwa 40 cm); in unteren Bereichen der Talhänge auch auf Weißjura gamma, daneben im Südwesten auch aus tonig-mergeliger Juranagelfluh)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der Hänge häufig steile, sonnseitige Hänge im Weißjura zeta2; oft Weidestörung, Fichten-Erstaufforstungen
	<b>Bodentyp</b>	Mergelrohboden bis Mergelrendzina
	<b>Humusform</b>	Kalkmoder bis Moder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Silene nutans-, Tanacetum corymbosum-, Carex flacca-, (Mercurialis perennis-, Calamagrostis varia-, Asarum europaeum-, Miliun effusum-, Pyrola) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Seggen-Buchenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Stieleiche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Feldahorn, Mehlbeere, Spitzahorn
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	StEi	1	2	2	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	RBu	1	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	3	3	3
		BAh	3	2	3	3
		Kie	2	3	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	3	3	3	3
	sonstige Laubbaumarten	MeBe, SaBi				
sonstige Nadelbaumarten	SKie					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	103,3 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (0,63 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	vor1970 - 81,3 %
		2000-09 - 0 %
		1990-99 - 11 %
	1970-79 - 7,6 %	

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_08_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_08_submontan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_08_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_08_submontan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_08_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_08_submontan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	6014 (trMeH), 6407, 9104, 7314 (MeH-), 9909, 7809 (trMeH), 7811 (MeH-), 9955

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)