

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/08 Südwestliche Donaulalb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

741 (566 bis 897) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,7 (6,2-7,3) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


888 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

450 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wfL

Buchen-Stieleichen-Wald auf wechselfeuchtem Lehm



satt'h'braun
schwarze Wellenlinien
schwarze Sandpunkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Wechselfeucht

in der


Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Moränenlehme

(Mindestens 50 cm sandig-schluffiger Lehm über tonigem Lehm bis lehmiger Ton der Altmoräneverwitterung, unterschiedlich staunässegeprägt mit charakteristisch marmoriertem Unterboden, spätestens ab 50 cm Tiefe; mit wechselndem Kiesanteil; Weißjura-Untergrund i.d.R. nicht erbohrbar)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen ebene Lagen
	Bodentyp	Pseudogley
	Humusform	Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Deschampsia cespitosa-, Stachys sylvatica-, Ajuga reptans - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Seegras
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Stieleiche
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Sommerlinde
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	StEi	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	3	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	2	2	2	2
		Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		BAh	2	2	3	3
		Fi	1	3	3	2
	sonstige Laubbaumarten	HBu				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	4,7 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,03 %)				
	Kartierzeitraum	1990-99 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_08_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_08_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_08_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9411				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de