

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/09 Hegaualb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

660 (482 bis 854) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,4 (6,7-8) Ø Temp. / Jahr [°C]

14,1 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


816 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

409 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

(wf)BT

Buchen-Eschen-Wald auf schwach wechselfeuchtem Bohnerzton



blaßoliv
h'grüne Querstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Schwach wechselfeucht

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Bohnerztone und -Tonlehme

(15 bis 20 cm, örtlich auch mehr als 30 cm, lockerer, mehr oder weniger deutlich staunässegezeichneter, schluffiger, schwach toniger bis toniger Lehm (oder selten auch lehmigem Ton bis zur Oberfläche) mit allmählichem Übergang zum unterlagernden, zähplastischen Ton aus Verwitterung alter, reliktscher, umgelagerter Kalkverwitterungslehme mit Rostfleckung; unterschiedliche Bohnerzführung; im Untergrund verkarsteter Weißjura; frei verfügbarer Kalk nur sporadisch im Unterboden)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Verebnungen und flache Mulden auf tiefgründigem Weißjura mit Bohnerzorkommen
	Bodentyp	pseudovergleyte Pelosol-Braunerde (bis Pseudogley-Parabraunerde)
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Rubus-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Hordelymus europaeus-, Mercurialis perennis-, Deschampsia cespitosa-, Urtica dioica-, Deschampsia flexuosa - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	selten Waldmeister-Buchenwald; selten Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2	1
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		StEi	3	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		BAh	2	2	2	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	keine Berechnung der Prozentanteilsklasse (0 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_09_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_09_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_09_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de