

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/09 Hegaualb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

660 (482 bis 854) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

7,4 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,1 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

816 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

409 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

kH-

Buchenwald auf mäßig trockenem kalkreichem Hang



h'grün

d'braune Schräggitter

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe Mäßig trocken

in der


Öko-Serie der kalkreichen Hänge

(An Steil- und Flachhängen wenig entwickelte oder sekundär kalkige Böden aus ± kiesig-(sandig)-lehmigem Geschiebemergel, meist als Mischsubstrate mit eingemischten Weißjurafestgesteinen und verwittertem Weißjura (Terra-fusca); am Oberhang teils verbackene Kiesschichten, teils mit Kalküberzügen; gelegentlich auch Weißjuramergel im Untergrund)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge exponierte, flache bis steile, oft konvexe Hanglagen
	Bodentyp	Pararendzina bis Terra fusca-Kalkbraunerde (Mischsubstrate)
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Miliun effusum-, Silene nutans-, Ajuga reptans-, Carex flacca-, (Urtica dioica-, Hordelymus europaeus) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Immenblatt; Seggen-Buchenwald; selten Waldgersten-Buchenwald mit Maiglöckchen
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	Gemeine Esche, Spitzahorn, Stieleiche, Vogelkirsche, Waldkiefer

	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1
	möglich (m)	Es	2	2	1	3
	weniger geeignet (w)	Dgl	3	2	3	2
		StEi	3	2	2	3
		Kie	-	-	-	-
	weniger- bis ungeeignet (w/u)	BAh	3	2	2	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	MeBe, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	1,1 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,35 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_6_09_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_6_09_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_6_09_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10027				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de