Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	1	Oberrheinisches Tiefland
Wuchsbezirk	1/02al	Kinzig-Murg-Rinne
Regionalwald:	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/03	Rheinebene von Rastatt bis Breisach
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/04	Freiburger Bucht
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/05	Rheinebene von Breisach bis Basel (Niederterrasse)
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/06	Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	1/07	Kaiserstuhl
	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald, örtlich mit Flaumeiche	
	1/08	Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	1/09	Dinkelberg
	Kolliner Buchenwald mit Eichen	

Ausgabestand: 19.05.2025

LFV Landes Forst Verwaltung BW

Baden-Württemberg

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortsfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortskundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-5	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 5)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
FlorL-BW2018	Florenliste von Baden-Württemberg 2018; Liste der in Baden-Württemberg etablierten oder in Etablierung begriffenen Farn- und Samenpflanzen	Dr. Karl Peter Buttler, Siegfried Demuth, Thomas Breunig Institut für Botanik und Landschaftskunde	2018
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Datenbank Management

IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

1 Mercurialis perennis - Gruppe

Auf sehr basenreichen Standorten mit alkalischer Bodenreaktion, sehr häufig auf carbonatreichen Böden (meist kalkreiche, teils kalkgründige Standortseinheiten); Wasserhaushalt mäßig frisch bis grundfeucht (feucht); Humusform ist L-Mull.

Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrespe)	FlorL-BW2018
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	FlorL-BW2018
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	FlorL-BW2018
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)	FlorL-BW2018
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	FlorL-BW2018
Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)	FlorL-BW2018
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Lilium martagon (Türkenbund)	FlorL-BW2018
Lithospermum purpurocaeruleum (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	FlorL-BW2018
Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)	FlorL-BW2018
Sanicula europaea (Sanikel)	FlorL-BW2018
Tamus communis (Schmerwurz)	Oberdf.2001
Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)	FlorL-BW2018

2 Deschampsia flexuosa - Gruppe

Weite Amplitude bzgl. der Bodenreaktion; auf schwach sauren bis stark sauren Standorten mit Schwerpunkt auf mäßig saurer Bodenreaktion; wegen ihres weiten ökologischen Spielraumes ist sie auf fast allen Standorten präsent; Wasserhaushalt mäßig trocken bis grundfeucht, auch schwach wechselfeucht bis wechselfeucht; Humusform Mull bis rohhumusartiger Moder.

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	FlorL-BW2018
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)	FlorL-BW2018
Carex pallescens (Bleiche Segge)	FlorL-BW2018
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	FlorL-BW2018
Cytisus scoparius (Besenginster)	FlorL-BW2018
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	FlorL-BW2018
Festuca altissima (Wald-Schwingel)	FlorL-BW2018
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	FlorL-BW2018
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	FlorL-BW2018
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	FlorL-BW2018
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	FlorL-BW2018

3 Luzula luzuloides - Gruppe

Sehr weite Amplitude bzgl. der Bodenreaktion, auf schwach sauren bis sauren Standorten; Wasserhaushalt grundfeucht bis mäßig trocken, auch schwach wechselfeucht bis wechselfeucht; Humusform Mull bis rohhumusartiger Moder.

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	FlorL-BW2018
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	FlorL-BW2018
Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)	FlorL-BW2018
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	FlorL-BW2018
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)	F&B-BW-1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	FlorL-BW2018
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

4 Milium effusum - Gruppe

Bzgl. Bodenreaktion und Wasserhaushalt mittlere Gruppe, mit ebenfalls aber weiter Amplitude; auf alkalischen bis mäßig sauren Standorten; Wasserhaushalt mit deutlichem Schwerpunkt auf mäßig frisch, aber auch grundfeucht bis mäßig trocken sowie schwach wechselfeucht bis wechselfeucht; Humusform Mull bis Moder.

Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
Carex pilosa (Wimper-Segge)	FlorL-BW2018
Carex umbrosa (Schatten-Segge)	FlorL-BW2018
Dactylis polygama (Wald-Knäuelgras)	FlorL-BW2018
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
Eurhynchium striatum (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwinge)	FlorL-BW2018
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut)	FlorL-BW2018
Hedera helix (Efeu)	FlorL-BW2018
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	FlorL-BW2018
Ilex aquifolium (Gewöhnliche Stechpalme)	FlorL-BW2018
Luzula pilosa (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	FlorL-BW2018
Milium effusum (Flattergras, Waldhirse)	FlorL-BW2018
Moehringia trinervia (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
Mycelis muralis (Mauerlattich)	FlorL-BW2018
Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)	FlorL-BW2018
Polygonatum verticillatum (Quirlblättrige Weißwurz)	FlorL-BW2018
Potentilla sterilis (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
Solidago virgaurea (Gewöhnliche Goldrute)	FlorL-BW2018
Stellaria holostea (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
Thuidium tamariscinum (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
Vinca minor (Kleines Immergrün)	FlorL-BW2018
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

5 Ajuga reptans - Gruppe

Auf alkalischen bis mäßig sauren Standorten; Wasserhaushalt frisch bis grundfeucht, auch mäßig frisch, sowie schwach wechselfeucht und wechselfeucht; Humusform Mull bis Moder.

Ajuga reptans (Kriechender Günsel)	FlorL-BW2018
Athyrium filix-femina (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex sylvatica (Wald-Segge)	FlorL-BW2018
Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)	FlorL-BW2018
Dryopteris dilatata (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
Dryopteris filix-mas (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarn)	F&B-BW-1
Festuca gigantea (Riesen-Schwingel)	FlorL-BW2018
Glechoma hederacea (Gundelrebe, Gundermann)	FlorL-BW2018
Lysimachia nemorum (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)	FlorL-BW2018
Petasites albus (Weiße Pestwurz)	FlorL-BW2018
Plagiomnium undulatum (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
Polystichum aculeatum (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
Ranunculus ficaria (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	FlorL-BW2018
Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)	FlorL-BW2018

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)	FlorL-BW2018

6 Stachys sylvatica - Gruppe

Auf Standorten mit alkalischer bis mäßig saurer Bodenreaktion; Wasserhaushalt frisch, grundfeucht bis feucht; örtlich auch tief grundfeucht; Humusform Mull bis Mullmoder.

Angelica sylvestris (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	FlorL-BW2018
Carex remota (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	FlorL-BW2018
Humulus lupulus (Gewöhnlicher Hopfen)	F&B-BW-2
Melandrium rubrum (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
Myosotis sylvatica (Wald-Vergißmeinnicht)	FlorL-BW2018
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rumex sanguineus (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)	FlorL-BW2018
Valeriana officinalis (Arzneibaldrian)	FlorL-BW2018

7 Silene nutans - Gruppe

Auf schwach sauren bis alkalischen Standorten. Wasserhaushalt mäßig frisch bis mäßig trocken, auch tief grundfeucht; Humusform ist Mull bis Mullmoder.

Betonica officinalis (Heilziest)	FlorL-BW2018
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	FlorL-BW2018
Carex montana (Berg-Segge)	FlorL-BW2018
Carex ornithopoda (Vogelfuß-Segge)	FlorL-BW2018
Clinopodium vulgare (Borstige Bergminze, Wirbeldost)	FlorL-BW2018
Colutea arborescens (Gewöhnlicher Blasenstrauch)	F&B-BW-3
Convallaria majalis (Maiglöckchen)	FlorL-BW2018
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)	FlorL-BW2018
Lathyrus niger (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

8 Impatiens noli-tangere - Gruppe

Auf Standorten mit alkalischer bis schwach saurer Bodenreaktion; Wasserhaushalt grundfeucht bis feucht; Humusform Mull.

Calystegia sepium (Gewöhnliche-, Echte Zaunwinde)	F&B-BW-5
Carex pendula (Hänge-Segge)	FlorL-BW2018
Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Impatiens noli-tangere (Rührmichnichtan)	FlorL-BW2018
Veronica montana (Berg-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

9 Filipendula ulmaria - Gruppe

Auf feuchten bis mäßig nassen, (teils auf grundfeuchten) Mineralböden und Anmoorböden, auch auf vererdeten Niedermooren; Humusform ist Feuchtmull; Erlen/Eschenwälder (Alno-Ulmion).

Carex elata (Steife Segge)	FlorL-BW2018
Cirsium oleraceum (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	FlorL-BW2018
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	FlorL-BW2018
Eupatorium cannabinum (Echter Wasserdost)	FlorL-BW2018
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	F&B-BW-3
Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	FlorL-BW2018
Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)	FlorL-BW2018

Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	FlorL-BW2018
Scirpus sylvaticus (Wald-Simse, Wald-Binse)	FlorL-BW2018

10 Tanacetum corymbosum - Gruppe

Schwach saure bis neutrale Bodenreaktion; Wasserhaushalt mäßig trocken (bis mäßig frisch); sommerlich austrocknend, manchmal verhagert. Humusform Mull bis Mullmoder.

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	FlorL-BW2018
Astragalus glycyphyllos (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze, Sauerdorn)	F&B-BW-1
Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)	FlorL-BW2018
Coronilla emerus (Strauchwicke, Strauchige Kronwicke)	F&B-BW-3
Dictamnus albus ((Weißer) Diptam)	FlorL-BW2018
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	FlorL-BW2018
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Melampyrum cristatum (Kamm-Wachtelweizen)	FlorL-BW2018
Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost)	FlorL-BW2018
Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	FlorL-BW2018
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	FlorL-BW2018
Rhytidium rugosum (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
Sorbus torminalis (Elsbeerbaum)	F&B-BW-3
Tanacetum corymbosum (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	FlorL-BW2018
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)	FlorL-BW2018

11 Carex acutiformis - Gruppe

Bodenreaktion schwach sauer bis alkalisch; Wasserhaushalt meist feucht bis nass; weniger grundfeucht; Feuchtmull bis Anmoor; Erlen/Eschenwälder (Alno-Ulmion) und Schwarzerlenbruchwälder (Alnion glutinosae).

Carex acutiformis (Sumpf-Segge)	FlorL-BW2018
Phragmites australis (Schilf)	FlorL-BW2018
Symphytum officinale (Arznei- oder Gwöhnlicher Beinwell)	FlorL-BW2018

12 Urtica dioica - Gruppe

Auf Standorten mit hoher Nitrifikation; oft starke Ausbreitung bei raschem Humusabbau und auf Flächen mit früherer landwirtschaftlicher Nutzung sowie auf Rekultivierungsböden; Wasserhaushalt mäßig frisch bis feucht; Bodenreaktion schwach sauer bis neutral; lichtliebend.

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	FlorL-BW2018
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Colchicum autumnale (Herbst-Zeitlose)	FlorL-BW2018
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	FlorL-BW2018
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	FlorL-BW2018
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	FlorL-BW2018
Stellaria media (Gewöhnliche Vogelmiere)	F&B-BW-1
Urtica dioica (Große Brennessel)	F&B-BW-2

13 Thelypteris palustris - Gruppe

Bodenreaktion schwach sauer bis alkalisch; Wasserhaushalt nass bis wechselnass; Anmoor bis Niedermoor; Erlen/Eschenwälder (Alno-Ulmion) und Schwarzerlenbruchwälder (Alnion glutinosae).

Calla palustris (Schlangenwurz)	FlorL-BW2018
Carex elongata (Walzen-, Langährige Segge)	FlorL-BW2018
Galium palustre (Echtes Sumpflabkraut)	FlorL-BW2018
Thelypteris palustris (Sumpf-Lappenfarn)	F&B-BW-1

14 Lunaria rediviva - Gruppe

Die Artengruppe beansprucht Standorte mit hoher Basensättigung und Nährstoffversorgung bei ausgeglichener Luftfeuchtigkeit; Humusform ist Mull bis Mullmoder; in der Regionalen Einheit selten.

Aruncus dioicus (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
Listera ovata (Großes Zweiblatt)	FlorL-BW2018
Lunaria rediviva (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
Phyllitis scolopendrium (Hirschzunge)	F&B-BW-1

15 Solanum dulcamara - Gruppe

Bzgl. der Bodenreaktion indifferente Gruppe, im Gebiet ausschließlich auf basen- und nährstoffreichen Standorten; Wasserhaushalt wechselnass bis nass, Feuchtmull bis Anmoor; Erlen-Eschenwälder (Alno-Ulmion) und Schwarzerlenbruchwälder (Alnion glutinosae).

Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	FlorL-BW2018
Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp)	FlorL-BW2018
Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)	FlorL-BW2018

16 Carex flacca - Gruppe

Auf kalkreichen Standorten, Wasserhaushalt mäßig trocken bis mäßig frisch;. Humusform ist meist L-Mull.

Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	FlorL-BW2018

17 Carex alba - Gruppe

Auf kalkreichen Standorten, Wasserhaushalt mäßig frisch bis grundfeucht; Humusform ist Mull.

Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	FlorL-BW2018
Carex alba (Weiße Segge)	FlorL-BW2018
Melica nutans (Nickendes Perlgras)	FlorL-BW2018
Prunus spinosa (Schlehe)	F&B-BW-3
Trifolium alpestre (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
Trifolium medium (Mittlerer-, Zickzack-Klee)	F&B-BW-3
Trifolium rubens (Purpur-Klee)	F&B-BW-3
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	FlorL-BW2018

18 Lamium galeobdolon - Gruppe

Auf Standorten mit alkalischer und neutraler bis sehr schwach saurer Bodenreaktion; Wasserhaushalt mäßig trocken bis feucht, mit Schwerpunkt von mäßig frisch bis grundfeucht, auch schwach wechselfeucht bis wechselfeucht; Humusform Mull bis Mullmoder.

Arum maculatum (Aronstab)	FlorL-BW2018
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	FlorL-BW2018
Cardamine bulbifera (Zwiebel-Zahnwurz, Knöllchen-Zahnwurz)	FlorL-BW2018
Carex digitata (Finger-Segge)	FlorL-BW2018
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)	FlorL-BW2018
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)	F&B-BW-3
Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenkäppchen)	FlorL-BW2018
Galium odoratum (Waldmeister)	FlorL-BW2018
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)	FlorL-BW2018
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	FlorL-BW2018
Neottia nidus-avis (Nestwurz)	FlorL-BW2018
Paris quadrifolia (Einbeere)	FlorL-BW2018
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	FlorL-BW2018
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Pulmonaria obscura (Dunkles Lungenkraut)	FlorL-BW2018
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1

19 Corydalis - Gruppe

Ausgesprochen enger Verbreitungsbereich; auf sehr basenreichen, auch carbonatreichen sowie nitratreichen Böden; Wasserhaushalt mäßig frisch bis grundfeucht; Humusform ist L-Mull; Artenreicher Buchenwald, Ahorn-Eschenwald, artenreicher Waldmeister-Buchenwald, artenreiche Hainbuchen-Stieleichenwälder.

Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	FlorL-BW2018
Allium ursinum (Bär-Lauch)	FlorL-BW2018
Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Corydalis solida (Fester-, Finger-Lerchensporn)	F&B-BW-1
Gagea lutea (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	FlorL-BW2018

20 Carex brizoides - Gruppe

Häufig auf Boden mit Stauwirkung im Oberboden oder auf oberflächlich dichtgelagerten Böden (Befahrungszeiger); bzgl. der Bodenreaktion indifferente Artengruppe; der Nitratbedarf ist gering bis mittel, Humusform ist Mull bis Moder.

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	FlorL-BW2018
Carex ovalis (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	FlorL-BW2018
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)	FlorL-BW2018
Juncus effusus (Flatter-Binse)	FlorL-BW2018

21 Molinia caerulea - Gruppe

Bzgl. der Bodenreaktion indifferent (Molinia caerulea) bis stark sauer (Frangula alnus); Wasserhaushalt schwach wechselfeucht bis wechselfeucht; Humusform Mullmoder bis rohhumusartiger Moder; lichtliebende Arten.

Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)	FlorL-BW2018
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	FlorL-BW2018

22 Rubus - Gruppe

Ökologisch sehr weites Spektrum hinsichtlich Wasserhaushalt, Zersetzung und Nitrifikation. Mächtiges Auftreten auf Blößen oder zusammenbrechenden Beständen; Die Artengruppe fehlt nur auf stark sauren Standorten; Wasserhaushalt mäßig frisch bis grundfeucht, auch schwach wechselfeucht; Humusform ist Mull bis Moder.

Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	FlorL-BW2018
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Impatiens glandulifera (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	FlorL-BW2018
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	FlorL-BW2018
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	FlorL-BW2018
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

23 Pteridium aquilinum - Gruppe

Standorte mit geringer Säurestufe; Wasserhaushalt wechselnd; Humusform; Halbschattenpflanze.

Pteridium aquilinum (Adlerfarn)	F&B-BW-1

24 Vaccinium - Gruppe

Vorwiegend im sauren bis stark sauren Bereich, begleitend auch im mäßig sauren Bereich möglich, auf durch Streunutzung versauerten Standorten; Wasserhaushalt tief grundfeucht, mäßig frisch bis mäßig trocken; Humusform Mullmoder bis rohhumusartiger Moder.

Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Hylocomium splendens (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2