Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	3	Schwarzwald
Wuchsbezirk	3/01	Nördliches Schwarzwaldvorland
Zonalwald:	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald	
	Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald	
	3/03	Vorgebirge des Nordschwarzwald
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
	3/04	Enzhöhen
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Kiefer	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Kiefer und Fichte	
	Hochmontaner Fichten-Tannen-Kiefern-Wald mit Buche	
	3/04al	Schwarzwaldrand bei Neuenbürg
Regionalwald:	Submontaner Buchen-Tannen-Wald	
	3/05	Hornisgrinde-Murg-Schwarzwald
Zonalwald:	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald	
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Kiefer	
	Montaner Tannen-Buchen-Fichten-Wald mit Kiefer	
	Hochmontaner Tannen-Fichten-Buchen-Wald mit Kiefer	
	3/06	Flächenschwarzwald
Regionalwald:	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
	3/06al	Ostrand des Flächenschwarzwald
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald	
	3/07	Mittlerer Schwarzwald zwischen Kinzig und Schwarzwaldhochstraße
Zonalwald:	Kolliner Buchenwald mit Bergahorn	
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
	Hochmontaner Tannen-Fichten-Kiefern-Wald mit Buche	
	3/08	Schwarzwaldrand bei Winzeln
Regionalwald:	Montaner Tannen-Buchen-Wald, örtlich mit Fichte	

Ausgabestand: 19.05.2025

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortsfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortskundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-4	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 4)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
Flora Euroaea, Vol. 1, ed. 2	Flora Euroaea, Vol. 1, ed. 2, Liste Verwendung in BZE 3 (und auch bei BZE2)		1984
FlorL-BW2018	Florenliste von Baden-Württemberg 2018; Liste der in Baden-Württemberg etablierten oder in Etablierung begriffenen Farn- und Samenpflanzen	Dr. Karl Peter Buttler, Siegfried Demuth, Thomas Breunig Institut für Botanik und Landschaftskunde	2018
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
Waldarten BW	Pflanzenarten des Waldes, einschl. der Säume, Vorwälder und Schlagflächen, sowie Gefährdung gemäß RL.	Spahl H., Tidow S.	1999
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Datenbank Management

IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

1 Leucobryum glaucum - Gruppe

Stark sauer bis mäßig sauer/nährstoffarm; trocken bis mäßig trocken.

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Cladonia spec. ((Rentier-)Flechtarten)	Flora Euroaea, Vol. 1, ed. 2
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Nardus stricta (Borstgras)	FlorL-BW2018
Polytrichum juniperinum (Wacholder-Widertonmoos)	MoosBW1
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	F&B-BW-2

2 Vaccinium - Gruppe

Stark sauer bis sauer; mäßig trocken bis frisch; Rohhumus (Moder).

Dicranella heteromalla (Einseitswendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum bergeri (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2

3 Blechnum spicant - Gruppe

Stark sauer bis sauer; feucht bis nass; nasser Rohhumus.

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Carex ovalis (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Plagiothecium undulatum (Gewelltblättrige Schiefkapselmoos, Wellenblättrige Schiefbüchsenmoos)	MoosBW2
Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2

4 Deschampsia flexuosa - Gruppe

Sauer bis mäßig sauer; mäßig trocken bis frisch; Moder (bis Rohhumus).

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	FlorL-BW2018
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	FlorL-BW2018
Cytisus scoparius (Besenginster)	FlorL-BW2018
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	FlorL-BW2018
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)	FlorL-BW2018
Galium saxatile (Harz-Labkraut)	FlorL-BW2018
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	FlorL-BW2018
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	FlorL-BW2018
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	FlorL-BW2018

5 Luzula luzuloides - Gruppe

Mäßig sauer bis schwach sauer; mäßig trocken bis frisch; (Mullmoder), Moder.

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	FlorL-BW2018
Festuca altissima (Wald-Schwingel)	FlorL-BW2018
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	FlorL-BW2018
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	FlorL-BW2018
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	FlorL-BW2018
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	FlorL-BW2018
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)	FlorL-BW2018
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

6 Milium effusum - Gruppe

Mäßig sauer bis alkalisch; mäßig trocken bis frisch; Mull bis Moder.

Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
Dactylis polygama (Wald-Knäuelgras)	FlorL-BW2018
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
Galium rotundifolium (Rundblättriges Labkraut)	FlorL-BW2018
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	FlorL-BW2018
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	FlorL-BW2018
Luzula pilosa (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	FlorL-BW2018
Milium effusum (Flattergras, Waldhirse)	FlorL-BW2018
Mycelis muralis (Mauerlattich)	FlorL-BW2018
Plagiomnium affine (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
Poa chaixii (Wald-Rispengras)	FlorL-BW2018
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)	FlorL-BW2018
Polygonatum verticillatum (Quirlblättrige Weißwurz)	FlorL-BW2018
Prenanthes purpurea (Hasenlattich)	FlorL-BW2018

7 Ajuga reptans - Gruppe

Schwerpunkt schwach sauer (selten alkalisch). Wasserhaushalt mäßig frisch bis frisch. Meist Mull bis Mullmoder (Moder).

Ajuga reptans (Kriechender Günsel)	FlorL-BW2018
Athyrium filix-femina (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex sylvatica (Wald-Segge)	FlorL-BW2018
Dryopteris dilatata (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
Dryopteris filix-mas (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarn)	F&B-BW-1
Glechoma hederacea (Gundelrebe, Gundermann)	FlorL-BW2018
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn)	F&B-BW-1
Knautia dipsacifolia (Waldknautie, Waldwitwenblume)	Oberdf.2001
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
Plagiochila asplenioides (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
Plagiomnium undulatum (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
Rhizomnium punctatum (Punktiertes Wurzelsternmoos)	MoosBW2
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	FlorL-BW2018
Senecio ovatus (Fuchs' Haingreiskraut)	FlorL-BW2018
Thelypteris phegopteris (Buchenfarn)	F&B-BW-1

8 Galium odoratum - Gruppe

Bodenreaktion schwach sauer bis neutral (alkalisch). Wasserhaushalt mäßig trocken bis frisch (grundfrisch). Humusform Mull bis Moder.

Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	FlorL-BW2018
Galium odoratum (Waldmeister)	FlorL-BW2018
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut)	FlorL-BW2018
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Hedera helix (Efeu)	FlorL-BW2018
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	FlorL-BW2018
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	FlorL-BW2018
Stellaria holostea (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

9 Stachys sylvatica - Gruppe

Mäßig sauer bis neutral; frisch bis sehr frisch, auch grundfrisch bis feucht; Mull bis Moder.

Angelica sylvestris (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	FlorL-BW2018
Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)	FlorL-BW2018
Eupatorium cannabinum (Echter Wasserdost)	FlorL-BW2018
Festuca gigantea (Riesen-Schwingel)	FlorL-BW2018
Lysimachia nemorum (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Paris quadrifolia (Einbeere)	FlorL-BW2018
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Ranunculus ficaria (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rumex sanguineus (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)	FlorL-BW2018
Valeriana officinalis (Arzneibaldrian)	FlorL-BW2018

10 Asarum europaeum - Gruppe

Die Bodenreaktion reicht von schwach sauer bis alkalisch. Die Arten der Asarum europaeum-Gruppe kommen auf mäßig trockenen bis mäßig frischen (frischen) Standorten vor. Humusform ist vorwiegend Mull.

Arum maculatum (Aronstab)	FlorL-BW2018
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Atropa bella-donna (Tollkirsche)	FlorL-BW2018
Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrespe)	FlorL-BW2018
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	FlorL-BW2018
Carex digitata (Finger-Segge)	FlorL-BW2018
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	FlorL-BW2018
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	FlorL-BW2018
Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz)	FlorL-BW2018
Hordelymus europaeus (Waldgerste)	FlorL-BW2018
Neottia nidus-avis (Nestwurz)	FlorL-BW2018
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
Sanicula europaea (Sanikel)	FlorL-BW2018
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018
Vinca minor (Kleines Immergrün)	FlorL-BW2018

11 Silene nutans - Gruppe

Der standörtliche Schwerpunkt der Silene nutans-Gruppe liegt im Bereich des trockenen bis mäßig trockenen Wasserhaushalts vor allem auf flachgründigen Kalkverwitterungslehmen. Hinsichtlich der Bodenreaktion sehr weites Spektrum. Die Toleranzspanne reicht von mäßig sauer bis neutral.

Betonica officinalis (Heilziest)	FlorL-BW2018
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	FlorL-BW2018
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	FlorL-BW2018
Carex montana (Berg-Segge)	FlorL-BW2018
Convallaria majalis (Maiglöckchen)	FlorL-BW2018
Cytisus nigricans (Schwarzwerdender Geißklee)	F&B-BW-3
Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwinge)	FlorL-BW2018
Lathyrus niger (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)	FlorL-BW2018
Primula veris (Arznei-, Wiesen-Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Rosa arvensis (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	FlorL-BW2018

12 Mercurialis perennis - Gruppe

Bodenreaktion neutral bis alkalisch (kalkhaltige Böden); mäßig trocken bis frisch; Mull.

Carex alba (Weiße Segge)	FlorL-BW2018
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Cypripedium calceolus (Frauenschuh)	FlorL-BW2018
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	FlorL-BW2018
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	FlorL-BW2018
Pulmonaria officinalis (Echtes Lungenkraut)	FlorL-BW2018

13 Tanacetum corymbosum - Gruppe

Schwach saure bis neutrale Bodenreaktion; Wasserhaushalt mäßig trocken (bis mäßig frisch); sommerlich austrocknend, manchmal verhagert. Humusform Mull bis Mullmoder.

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	FlorL-BW2018
Aster amellus (Kalk-Aster, Berg-Aster)	FlorL-BW2018
Buphtalmum salicifolium ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)	FlorL-BW2018
Bupleurum longifolium (Langblättriges-, Wald- Hasenohr)	FlorL-BW2018
Coronilla coronata (Berg-Kronwicke)	F&B-BW-3
Galium glaucum (Blaugrünes Labkraut)	FlorL-BW2018
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Homalothecium lutescens (Gelbliches Krummbüchsenmoos)	MoosBW2
Inula salicina (Weiden-Alant)	FlorL-BW2018
Laserpitium latifolium (Breitblättriges Laserkraut)	FlorL-BW2018
Lithospermum purpurocaeruleum (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	FlorL-BW2018
Peucedanum officinale (Arznei-, Echter Haarstrang)	FlorL-BW2018
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	FlorL-BW2018
Rhytidium rugosum (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
Seseli libanotis (Heilwurz)	FlorL-BW2018
Tanacetum corymbosum (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	FlorL-BW2018

Thesium bavarum (Berg-Leinblatt)	FlorL-BW2018
Trifolium alpestre (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
Trifolium montanum (Berg-Klee)	F&B-BW-3
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)	FlorL-BW2018
Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

14 Rubus - Gruppe

Ökologisch sehr weites Spektrum hinsichtlich Wasserhaushalt, Zersetzung und Nitrifikation. Mächtiges Auftreten auf Kahlschlägen und angerissenen Fichten-Beständen auf allen Standorten. Rubus fructicosus liebt eher Böden mit höherem Sandanteil, Rubus idaeus Böden mit guter Verlehmung. Die Artengruppe tritt auf stark sauren und basenarmen Böden zurück, fehlt aber selten ganz. Wasserhaushalt mäßig frisch bis frisch (schwach wechselfeucht). Humusform ist Mullmoder bis Rohhumus.

Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	FlorL-BW2018
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	FlorL-BW2018
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	FlorL-BW2018

15 Urtica dioica - Gruppe

Nitrifizierungszeiger mit weiter Spanne von Bodenreaktion und Wasserhaushalt; Mull bis Moder.

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	FlorL-BW2018
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	FlorL-BW2018
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Lamium album (Weiße Taubnessel)	FlorL-BW2018
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	FlorL-BW2018
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	FlorL-BW2018
Urtica dioica (Große Brennessel)	F&B-BW-2

16 Corydalis cava - Gruppe

Bodenreaktion neutral bis alkalisch; Standorte frisch bis feucht; gute Wasserversorgung vor allem im Frühjahr; Mull; Kleebwaldarten.

Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	FlorL-BW2018
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
Corydalis cava (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1
Corydalis solida (Fester-, Finger-Lerchensporn)	F&B-BW-1
Gagea lutea (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	FlorL-BW2018
Scilla bifolia (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	FlorL-BW2018

17 Aruncus dioicus - Gruppe

Schluchtwaldarten; mäßig sauer bis alkalisch; Moder bis Mull.

Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Aruncus dioicus (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
Lunaria rediviva (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
Phyllitis scolopendrium (Hirschzunge)	F&B-BW-1
Polystichum aculeatum (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
Veronica urticifolia (Nesselblättriger Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

18 Impatiens noli-tangere - Gruppe

Mäßig sauer bis alkalisch; mäßig frisch bis feucht, nass; (Feucht-)Mull bis Mullmoder.

Carex pendula (Hänge-Segge)	FlorL-BW2018
Chaerophyllum hirsutum (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	FlorL-BW2018
Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges-, Paarblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Impatiens noli-tangere (Rührmichnichtan)	FlorL-BW2018
Petasites albus (Weiße Pestwurz)	FlorL-BW2018
Stellaria alsine (Quell-Sternmiere)	F&B-BW-1

19 Iris pseudacorus - Gruppe

Schwach saure bis neutrale Standorte. Mäßig frische bis feuchte Lagen. Humusform Mull bis Moder.

Calliergonella cuspidata (Spießmoos)	MoosBW2
Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
Carex acutiformis (Sumpf-Segge)	FlorL-BW2018
Cirsium oleraceum (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	FlorL-BW2018
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	FlorL-BW2018
Climacium dendroides (Bäumchenartiges Leitermoos)	MoosBW2
Crepis paludosa (Sumpf-Pippau)	FlorL-BW2018
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	F&B-BW-3
Galium palustre (Echtes Sumpflabkraut)	FlorL-BW2018
Galium uliginosum (Moor-Labkraut)	FlorL-BW2018
Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	FlorL-BW2018
Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp)	FlorL-BW2018
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	FlorL-BW2018
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	FlorL-BW2018
Phragmites australis (Schilf)	FlorL-BW2018
Scirpus sylvaticus (Wald-Simse, Wald-Binse)	FlorL-BW2018
Scrophularia umbrosa (Geflügelte Braunwurz)	FlorL-BW2018
Scutellaria galericulata (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	FlorL-BW2018
Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)	FlorL-BW2018
Valeriana dioica (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	FlorL-BW2018

20 Juncus - Gruppe

Mäßig sauer bis schwach sauer; wechselfeucht bis feucht/oberflächlich dichtgelagert; Moder (bis Mull).

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	FlorL-BW2018
Carex remota (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	FlorL-BW2018
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	FlorL-BW2018
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)	FlorL-BW2018
Juncus effusus (Flatter-Binse)	FlorL-BW2018

21 Molinia - Gruppe

Meist stark sauer bis mäßig sauer; tiefsitzende Feuchte/Wechselfeuchte; Rohhumusmoder, Feuchthumusformen; Lichtarten.

Frangula alnus (Faulbaum)	F&B-BW-4
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	FlorL-BW2018
Molinia spec. (Pfeifengras-Arten)	Waldarten BW
Pteridium aquilinum (Adlerfarn)	F&B-BW-1

22 Carex flacca - Gruppe

Mäßig sauer bis alkalisch; feucht bis nass/sickerfeucht; Mull bis Mullmoder.

Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	FlorL-BW2018

23 Pyrola - Gruppe

Störungszeiger; meist auf Nadelbaum-(Erst-) Aufforstungen ehemaliger Weideflächen; häufig auf kalkigem Untergrund mit sauren bis stark sauren Humusformen: (Moder), Rohhumusartiger Moder, Rohhumus, Hagerhumus.

Melampyrum sylvaticum (Wald-Wachtelweizen)	FlorL-BW2018
Moneses uniflora (Einblütiges Wintergrün)	FlorL-BW2018
Orthilia secunda (Nickendes Wintergrün)	FlorL-BW2018
Pyrola minor (Kleines Wintergrün)	F&B-BW-2

24 Adenostyles alliariae - Gruppe

Mäßig sauer bis neutral; sehr frisch bis feucht; Mull bis Moder.

Adenostyles alliariae (Grauer Alpendost, Roßlattich)	FlorL-BW2018
Athyrium distentifolium (Alpen-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Rumex alpestris (Berg-Sauerampfer)	Oberdf.2001

25 Sphagnum angustifolium - Gruppe

Stark sauer bis sauer; feucht bis nass; nasser Rohhumus.

Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Sphagnum angustifolium (Kurzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum girgensohnii (Girgensohnsches Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum nemoreum (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum palustre (Kahnblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum quinquefarium (Fünfzeiliges Bleichmoos)	MoosBW3

26 Oxycoccus palustris - Gruppe

Bodenreaktion stark sauer bis (mäßig) sauer; Wasserhaushalt feucht bis nass; nasser Rohhumus.

Eriophorum vaginatum (Moor-Wollgras)	FlorL-BW2018
Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
Sphagnum fuscum (Braunes Bleichmoos, Braunes Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum magellanicum (Mittleres Torf- oder Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum rubellum (Rötliches Bleichmoos)	MoosBW3
Trichophorum cespitosum (Gewöhnliche Rasenbinse)	FlorL-BW2018
Vaccinium uliginosum (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2