Forstliche Versuchs-
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg

Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	3	Schwarzwald
Wuchsbezirk	3/03al	Schwarzwaldrand zwischen Kinzig und Elz
Zonalwald:	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald	
	3/09	Mittlerer Schwarzwald zwischen Kinzig und Dreisam
	Kolliner Buchenwald mit Bergahorn	
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald, örtlich mit Fichte	
	Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
	3/10	Westlicher Südschwarzwald
	Kolliner Buchenwald mit Bergahorn	
	Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald mit Bergahorn	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Bergahorn, örtlich mit Fichte	
	Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Bergahorn, örtlich mit Fichte	
	3/11	Hotzenwald
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Traubeneiche	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald, örtlich mit Fichte	
	3/12	Schopfheimer Bergland
Regionalwald:	Submontaner Buchenwald mit Tanne und Traubeneiche	
	3/13	Östlicher Südschwarzwald
Zonalwald:	Montaner Tannen-Buchen-Wald mit Fichte	
	Hochmontaner Fichten-Tannen-Buchen-Wald mit Bergahorn	
	3/14	Südöstlicher Mittlerer Schwarzwald
	Montaner Tannen-Buchen-Wald mit Fichte	
	Hochmontaner Tannen-Buchen-Fichten-Wald	

Ausgabestand: 19.05.2025

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortsfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortskundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
F&B-BW-8	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 8)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1998
FlechBW1	Die Flechten Baden-Württembergs (Band 1)	Wirth, Volkmar	1995
FlorL-BW2018	Florenliste von Baden-Württemberg 2018; Liste der in Baden-Württemberg etablierten oder in Etablierung begriffenen Farn- und Samenpflanzen	Dr. Karl Peter Buttler, Siegfried Demuth, Thomas Breunig Institut für Botanik und Landschaftskunde	2018
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
Waldarten BW	Pflanzenarten des Waldes, einschl. der Säume, Vorwälder und Schlagflächen, sowie Gefährdung gemäß RL.	Spahl H., Tidow S.	1999
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Datenbank Management

IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

1 Leucobryum glaucum - Gruppe

Stark sauer bis mäßig sauer/nährstoffarm; trocken bis mäßig trocken.

Cladonia arbuscula ()	FlechBW1
Cladonia rangiferina (Rentierflechte)	FlechBW1
Dicranum spurium (Unechtes Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Polytrichum juniperinum (Wacholder-Widertonmoos)	MoosBW1

2 Vaccinium - Gruppe

Stark sauer bis sauer; mäßig trocken bis frisch; Rohhumus (Moder).

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Campylopus flexuosus (Bogiges Krummstielmoos)	MoosBW1
Dicranella heteromalla (Einseitswendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum bergeri (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Hypnum cupressiforme (Zöpfchenmoos, Zypressen-Schlafmoos)	MoosBW2
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp)	F&B-BW-1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	F&B-BW-2

3 Luzula luzuloides - Gruppe

Mäßig sauer bis schwach sauer; mäßig trocken bis frisch; (Mullmoder), Moder.

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	FlorL-BW2018
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	FlorL-BW2018
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	FlorL-BW2018
Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)	FlorL-BW2018
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	FlorL-BW2018
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	FlorL-BW2018
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	FlorL-BW2018
Poa chaixii (Wald-Rispengras)	FlorL-BW2018
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	FlorL-BW2018
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

4 Blechnum spicant - Gruppe

Stark sauer bis sauer; feucht bis nass; nasser Rohhumus.

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1
Listera cordata (Herz-Zweiblatt)	FlorL-BW2018
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Plagiothecium undulatum (Gewelltblättrige Schiefkapselmoos, Wellenblättrige Schiefbüchsenmoos)	MoosBW2
Ptilidium ciliare (Großes Federchenmoos)	MoosBW3

Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2

5 Deschampsia flexuosa - Gruppe

Sauer bis mäßig sauer; mäßig trocken bis frisch; Moder (bis Rohhumus).

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	FlorL-BW2018
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)	FlorL-BW2018
Arnica montana (Berg-Wohlverleih, Arnika)	FlorL-BW2018
Cytisus scoparius (Besenginster)	FlorL-BW2018
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	FlorL-BW2018
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)	FlorL-BW2018
Galium saxatile (Harz-Labkraut)	FlorL-BW2018
Genista germanica (Deutscher Ginster)	F&B-BW-3
Genista sagittalis (Flügel-Ginster)	F&B-BW-3
Gnaphalium sylvaticum (Wald-Ruhrkraut)	FlorL-BW2018
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	FlorL-BW2018
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	FlorL-BW2018
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	FlorL-BW2018
Melampyrum sylvaticum (Wald-Wachtelweizen)	FlorL-BW2018
Meum athamanticum (Bärwurz)	FlorL-BW2018
Potentilla erecta (Blutwurz)	F&B-BW-3
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)	F&B-BW-1

6 Sphagnum angustifolium - Gruppe

Stark sauer bis sauer; feucht bis nass; nasser Rohhumus.

Dicranodontium denudatum (Bruchblattmoos)	MoosBW1
Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Sphagnum angustifolium (Kurzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum girgensohnii (Girgensohnsches Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum nemoreum (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum quinquefarium (Fünfzeiliges Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum squarrosum (Sperriges Bleichmoos)	MoosBW3

7 Oxycoccus palustris - Gruppe

Stark saure bis saure, feuchte bis nasse Torfe; lichtliebende Moorwald- und Hochmoorpflanzen.

Andromeda polifolia (Rosmarinheide, Andromeda)	F&B-BW-2
Aulacomnium palustre (Sumpf-Streifensternmoos)	MoosBW2
Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau)	F&B-BW-3
Eriophorum vaginatum (Moor-Wollgras)	FlorL-BW2018
Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
Polytrichum strictum (Moor-Widertonmoos)	MoosBW1
Potentilla palustris (Blutauge)	F&B-BW-3
Sphagnum fuscum (Braunes Bleichmoos, Braunes Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum magellanicum (Mittleres Torf- oder Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum palustre (Kahnblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum rubellum (Rötliches Bleichmoos)	MoosBW3
Trichophorum cespitosum (Gewöhnliche Rasenbinse)	FlorL-BW2018
Vaccinium uliginosum (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2
Viola palustris (Sumpf-Veilchen)	F&B-BW-2

8 Silene nutans - Gruppe

Der standörtliche Schwerpunkt der Silene nutans-Gruppe liegt im Bereich des trockenen bis mäßig trockenen Wasserhaushalts vor allem auf flachgründigen Kalkverwitterungslehmen. Hinsichtlich der Bodenreaktion sehr weites Spektrum. Die Toleranzspanne reicht von mäßig sauer bis neutral.

Astragalus glycyphyllos (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
Betonica officinalis (Heilziest)	FlorL-BW2018
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	FlorL-BW2018
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	FlorL-BW2018
Carex montana (Berg-Segge)	FlorL-BW2018
Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwinge)	FlorL-BW2018
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus niger (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
Melica nutans (Nickendes Perlgras)	FlorL-BW2018
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	FlorL-BW2018
Scleropodium purum (Großes Grünstengelmoos)	MoosBW2
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1

9 Milium effusum - Gruppe

Mäßig sauer bis alkalisch; mäßig trocken bis frisch; Mull bis Moder.

Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
Carex pilosa (Wimper-Segge)	FlorL-BW2018
Carex umbrosa (Schatten-Segge)	FlorL-BW2018
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
Dactylis glomerata (Wiesen-, Gewöhnliches Knäuelgras)	FlorL-BW2018
Dactylis polygama (Wald-Knäuelgras)	FlorL-BW2018
Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	FlorL-BW2018
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
Eurhynchium striatum (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
Festuca altissima (Wald-Schwingel)	FlorL-BW2018
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
Galium rotundifolium (Rundblättriges Labkraut)	FlorL-BW2018
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut)	FlorL-BW2018
Hedera helix (Efeu)	FlorL-BW2018
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	FlorL-BW2018
Luzula pilosa (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	FlorL-BW2018
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	FlorL-BW2018
Milium effusum (Flattergras, Waldhirse)	FlorL-BW2018
Moehringia trinervia (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
Mycelis muralis (Mauerlattich)	FlorL-BW2018
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)	FlorL-BW2018
Plagiomnium affine (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
Plagiomnium cuspidatum (Spieß-Kriechsternmoos)	MoosBW2
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)	FlorL-BW2018
Polygonatum verticillatum (Quirlblättrige Weißwurz)	FlorL-BW2018
Potentilla sterilis (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
Prenanthes purpurea (Hasenlattich)	FlorL-BW2018
Rhytidiadelphus triquetrus (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
Solidago virgaurea (Gewöhnliche Goldrute)	FlorL-BW2018
Stellaria holostea (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
Thuidium tamariscinum (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

Viola riviniana (Hain-Veilchen)	F&B-BW-2

10 Ajuga reptans - Gruppe

Mäßig sauer bis neutral; frisch bis feucht; Mull bis Moder.

Ajuga reptans (Kriechender Günsel)	FlorL-BW2018
Athyrium filix-femina (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex sylvatica (Wald-Segge)	FlorL-BW2018
Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)	FlorL-BW2018
Dryopteris dilatata (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
Dryopteris filix-mas (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarn)	F&B-BW-1
Festuca gigantea (Riesen-Schwingel)	FlorL-BW2018
Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Glechoma hederacea (Gundelrebe, Gundermann)	FlorL-BW2018
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn)	F&B-BW-1
Knautia dipsacifolia (Waldknautie, Waldwitwenblume)	Oberdf.2001
Lysimachia nemorum (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
Plagiochila asplenioides (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
Plagiomnium undulatum (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
Ranunculus ficaria (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	FlorL-BW2018
Senecio ovatus (Fuchs' Haingreiskraut)	FlorL-BW2018
Thelypteris phegopteris (Buchenfarn)	F&B-BW-1

11 Stachys sylvatica - Gruppe

Mäßig sauer bis neutral; frisch bis sehr frisch, auch grundfrisch bis feucht; Mull bis Moder.

Angelica sylvestris (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	FlorL-BW2018
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	FlorL-BW2018
Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Melandrium rubrum (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
Myosotis sylvatica (Wald-Vergißmeinnicht)	FlorL-BW2018
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rumex sanguineus (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)	FlorL-BW2018
Valeriana officinalis (Arzneibaldrian)	FlorL-BW2018

12 Tanacetum corymbosum - Gruppe

Schwach saure bis neutrale Bodenreaktion; Wasserhaushalt mäßig trocken (bis mäßig frisch); sommerlich austrocknend, manchmal verhagert. Humusform Mull bis Mullmoder.

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	FlorL-BW2018
Aster amellus (Kalk-Aster, Berg-Aster)	FlorL-BW2018
Bromus erectus (Aufrechte Trespe)	FlorL-BW2018
Buphtalmum salicifolium ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)	FlorL-BW2018
Carex humilis (Erd-Segge, Niedrige Segge)	F&B-BW-8
Coronilla coronata (Berg-Kronwicke)	F&B-BW-3
Galium glaucum (Blaugrünes Labkraut)	FlorL-BW2018
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Laserpitium latifolium (Breitblättriges Laserkraut)	FlorL-BW2018
Lithospermum purpurocaeruleum (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001

Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee)	F&B-BW-3
Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	FlorL-BW2018
Peucedanum officinale (Arznei-, Echter Haarstrang)	FlorL-BW2018
Rhytidium rugosum (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
Seseli libanotis (Heilwurz)	FlorL-BW2018
Sesleria albicans (Kalk-Blaugras)	Oberdf.2001
Tanacetum corymbosum (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	FlorL-BW2018
Thesium bavarum (Berg-Leinblatt)	FlorL-BW2018
Trifolium alpestre (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
Trifolium montanum (Berg-Klee)	F&B-BW-3
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)	FlorL-BW2018
Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

13 Impatiens noli-tangere - Gruppe

Mäßig sauer bis alkalisch; bewegt feucht bis nass/quellig; (Feucht-)Mull bis (Feucht-)Moder.

Aconitum napellus (Blauer Eisenhut)	F&B-BW-1
Aconitum vulparia (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
Carex pendula (Hänge-Segge)	FlorL-BW2018
Carex remota (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	FlorL-BW2018
Carex strigosa (Dünnährige Segge, Schlanke Segge)	FlorL-BW2018
Chaerophyllum hirsutum (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	FlorL-BW2018
Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges-, Paarblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Circaea alpina (Alpen-Hexenkraut)	FlorL-BW2018
Circaea intermedia (Mittleres Hexenkraut)	FlorL-BW2018
Cratoneuron filicinum (Farnähnliches Starknervmoos)	MoosBW2
Crepis paludosa (Sumpf-Pippau)	FlorL-BW2018
Equisetum hyemale (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Eupatorium cannabinum (Echter Wasserdost)	FlorL-BW2018
Impatiens glandulifera (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	FlorL-BW2018
Impatiens noli-tangere (Rührmichnichtan)	FlorL-BW2018
Petasites albus (Weiße Pestwurz)	FlorL-BW2018
Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)	FlorL-BW2018
Polygonum bistorta (Wiesenknöterich)	F&B-BW-1
Ranunculus aconitifolius (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Stellaria alsine (Quell-Sternmiere)	F&B-BW-1
Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1
Veronica montana (Berg-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

14 Iris pseudacorus - Gruppe

Schwach saure bis neutrale Standorte. Mäßig frische bis feuchte Lagen. Humusform Mull bis Moder, Feuchthumusformen.

Calliergonella cuspidata (Spießmoos)	MoosBW2
Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
Carex acutiformis (Sumpf-Segge)	FlorL-BW2018
Carex riparia (Ufer-Segge)	FlorL-BW2018
Carex vesicaria (Blasen-Segge)	FlorL-BW2018
Cirsium oleraceum (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	FlorL-BW2018
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	F&B-BW-3
Galium palustre (Echtes Sumpflabkraut)	FlorL-BW2018
Galium uliginosum (Moor-Labkraut)	FlorL-BW2018

Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	FlorL-BW2018
Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp)	FlorL-BW2018
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	FlorL-BW2018
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	FlorL-BW2018
Phragmites australis (Schilf)	FlorL-BW2018
Scirpus sylvaticus (Wald-Simse, Wald-Binse)	FlorL-BW2018
Scrophularia umbrosa (Geflügelte Braunwurz)	FlorL-BW2018
Scutellaria galericulata (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	FlorL-BW2018
Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)	FlorL-BW2018
Valeriana dioica (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	FlorL-BW2018

15 Lamium galeobdolon - Gruppe

Schwach sauer bis alkalisch; frisch bis feucht, selten mäßig frisch, dann aber zumindest frühjahrsfrisch; Mull bis Mullmoder.

Arum maculatum (Aronstab)	FlorL-BW2018
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	FlorL-BW2018
Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrespe)	FlorL-BW2018
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	FlorL-BW2018
Cardamine bulbifera (Zwiebel-Zahnwurz, Knöllchen-Zahnwurz)	FlorL-BW2018
Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex digitata (Finger-Segge)	FlorL-BW2018
Centaurea montana (Berg-Flockenblume)	FlorL-BW2018
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	FlorL-BW2018
Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz)	FlorL-BW2018
Fissidens taxifolius (Eibenblättriges Spaltzahnmoos)	MoosBW1
Galium odoratum (Waldmeister)	FlorL-BW2018
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Hordelymus europaeus (Waldgerste)	FlorL-BW2018
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche)	FlorL-BW2018
Neottia nidus-avis (Nestwurz)	FlorL-BW2018
Paris quadrifolia (Einbeere)	FlorL-BW2018
Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
Plagiomnium rostratum (Geschnäbeltes Kriechsternmoos)	MoosBW2
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	FlorL-BW2018
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Pulmonaria obscura (Dunkles Lungenkraut)	FlorL-BW2018
Pulmonaria officinalis (Echtes Lungenkraut)	FlorL-BW2018
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rosa arvensis (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	FlorL-BW2018
Vinca minor (Kleines Immergrün)	FlorL-BW2018

16 Mercurialis perennis - Gruppe

Bodenreaktion neutral bis alkalisch (kalkhaltige Böden); mäßig trocken bis frisch; Mull.

Carex alba (Weiße Segge)	FlorL-BW2018
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	FlorL-BW2018
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)	FlorL-BW2018

Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Cypripedium calceolus (Frauenschuh)	FlorL-BW2018
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	FlorL-BW2018
Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)	FlorL-BW2018
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Hepatica nobilis (Leberblümchen)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Lilium martagon (Türkenbund)	FlorL-BW2018
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)	FlorL-BW2018
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	FlorL-BW2018
Rubus saxatilis (Steinbeere)	F&B-BW-3
Sanicula europaea (Sanikel)	FlorL-BW2018
Stachys alpina (Alpen-Ziest)	FlorL-BW2018
Tortella tortuosa (Gekräuseltes Spiralzahnmoos)	MoosBW1

17 Aruncus dioicus - Gruppe

Schluchtwaldarten; mäßig sauer bis alkalisch; Moder bis Mull.

Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Aruncus dioicus (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
Lunaria rediviva (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
Phyllitis scolopendrium (Hirschzunge)	F&B-BW-1
Polystichum aculeatum (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
Polystichum lonchitis (Lanzen-Schildfarn)	F&B-BW-1
Veronica urticifolia (Nesselblättriger Ehrenpreis)	FlorL-BW2018

18 Molinia - Gruppe

Meist stark sauer bis mäßig sauer; tiefsitzende Feuchte/Wechselfeuchte; Rohhumusmoder, Feuchthumusformen; Lichtarten.

Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)	FlorL-BW2018
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	FlorL-BW2018

19 Carex flacca - Gruppe

Mäßig sauer bis alkalisch; feucht bis nass/sickerfeucht; Mull bis Moder.

Calamagrostis varia (Buntes-, Berg-Reitgras)	FlorL-BW2018
Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	FlorL-BW2018
Crataegus spec. (Weißdorn)	Waldarten BW

20 Juncus - Gruppe

Mäßig sauer bis schwach sauer; wechselfeucht bis feucht/oberflächlich dichtgelagert; Moder (bis Mull).

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	FlorL-BW2018
Carex ovalis (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
Carex pallescens (Bleiche Segge)	FlorL-BW2018
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	FlorL-BW2018
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)	FlorL-BW2018
Juncus effusus (Flatter-Binse)	FlorL-BW2018
Luzula multiflora (Vielblütiges Hasenbrot, Vielbl. Hainsimse)	FlorL-BW2018
Tussilago farfara (Huflattich)	FlorL-BW2018

21 Corydalis cava - Gruppe

Bodenreaktion neutral bis alkalisch; Standorte frisch bis feucht; gute Wasserversorgung vor allem im Frühjahr; Mull; Kleebwaldarten.

Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	FlorL-BW2018
Allium ursinum (Bär-Lauch)	FlorL-BW2018
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
Corydalis cava (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1
Gagea lutea (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	FlorL-BW2018
Leucojum vernum (Märzenbecher)	FlorL-BW2018
Scilla bifolia (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	FlorL-BW2018

22 Adenostyles alliariae - Gruppe

Mäßig sauer bis neutral; sehr frisch bis feucht; Mull bis Moder.

Adenostyles alliariae (Grauer Alpendost, Roßlattich)	FlorL-BW2018
Athyrium distentifolium (Alpen-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Cicerbita alpina (Alpen-Milchlattich)	FlorL-BW2018
Rumex alpestris (Berg-Sauerampfer)	Oberdf.2001
Senecio hercynicus (Hain-Greiskraut)	FlorL-BW2018
Streptopus amplexifolius (Knotenfuß)	FlorL-BW2018

23 Urtica dioica - Gruppe

Nitrifizierungszeiger mit weiter Spanne von Bodenreaktion und Wasserhaushalt; Mull bis Moder.

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	FlorL-BW2018
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Atropa bella-donna (Tollkirsche)	FlorL-BW2018
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	FlorL-BW2018
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	FlorL-BW2018
Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)	FlorL-BW2018
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	FlorL-BW2018
Lapsana communis (Rainkohl)	FlorL-BW2018
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)	FlorL-BW2018
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	FlorL-BW2018
Urtica dioica (Große Brennessel)	F&B-BW-2

24 Rubus - Gruppe

Ökologisch sehr weites Spektrum hinsichtlich Wasserhaushalt, Zersetzung und Nitrifikation. Mächtiges Auftreten auf Kahlschlägen und angerissenen Fichten-Beständen auf allen Standorten. Rubus fructicosus liebt eher Böden mit höherem Sandanteil, Rubus idaeus Böden mit guter Verlehmung. Die Artengruppe tritt auf stark sauren und basenarmen Böden zurück, fehlt aber selten ganz. Wasserhaushalt mäßig frisch bis frisch (schwach wechselfeucht). Humusform ist Mullmoder bis Rohhumus.

Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	FlorL-BW2018
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	FlorL-BW2018