




Forstliche Versuchs-
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg



Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	4	Neckarland (mit Kraichgau, Bauland und Taubergrund)
Wuchsbezirk	4/01	Taubergrund (mit Westrand der Fränkischen Platte)
Regionalwald:	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald	
	4/18	Vorderes Bauland
	Submontaner Buchenwald mit Traubeneiche	
	4/19	Hinteres Bauland
	Submontaner Buchen-Traubeneichen-Hainbuchen-Wald	

Ausgabestand: 13.09.2024



Baden-Württemberg

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
FlechBW1	Die Flechten Baden-Württembergs (Band 1)	Wirth, Volkmar	1995
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
RL Farn/Sam 2000 BW	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

1 Leucobryum glaucum - Gruppe

(stark sauer bis sauer; trocken bis mäßig frische, periodisch auch stagnierende Nässe; häufig verhagerte Böden; Rohhumus bis Hagerhumus, elten bis Moder; lichtliebende Arten)

Cladonia spec. ((Rentier-)Flechtenarten)	FlechBW1
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1

2 Pleurozium schreberi - Gruppe

(stark sauer bis sauer; mäßig trocken bis frisch, selten außerhalb der Ränder; Rohhumus (Moder))

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Dicranum bergeri (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Moneses uniflora (Einblütiges Wintergrün)	RL Farn/Sam 2000 BW
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Pyrola minor (Kleines Wintergrün)	F&B-BW-2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2

3 Deschampsia flexuosa - Gruppe

(sauer bis mäßig sauer; mäßig trocken bis frisch; Moder (bis Rohhumus))

Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Dicranella heteromalla (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Genista germanica (Deutscher Ginster)	F&B-BW-3
Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)	Oberdf.2001
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
Hylocomium splendens (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus triquetrus (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

4 Luzula luzuloides - Gruppe

(mäßig sauer bis schwach sauer; mäßig trocken bis frisch; Mullmoder bis Moder)

Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1

5 Sphagnum angustifolium - Gruppe

(stark sauer bis sauer; feucht bis nass; nasser Rohhumus)

Sphagnum angustifolium (Kurzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum nemoreum (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3

6 *Silene nutans* - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral; trocken bis mäßig trocken; Mull bis Mullmoder, selten Moder)

<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Campanula persicifolia</i> (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Carex montana</i> (Berg-Segge)	Oberdf.2001
<i>Convallaria majalis</i> (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia cyparissias</i> (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Festuca heterophylla</i> (Verschiedenblättriger Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Inula conyzae</i> (Dürrwurz)	Oberdf.2001
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
<i>Melampyrum cristatum</i> (Kamm-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
<i>Primula veris</i> (Arznei-, Wiesen-Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Silene nutans</i> (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
<i>Tanacetum corymbosum</i> (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
<i>Trifolium montanum</i> (Berg-Klee)	F&B-BW-3
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001

7 *Milium effusum* - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral, selten alkalisch; mäßig trocken bis frisch mit deutlichem Schwerpunkt bei mäßig frisch; Mull bis Moder)

<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Atrichum undulatum</i> (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
<i>Carex umbrosa</i> (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Festuca altissima</i> (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium rotundifolium</i> (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Hieracium murorum</i> (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Melica uniflora</i> (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Flattergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Moehringia trinervia</i> (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium affine</i> (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)	Oberdf.2001
<i>Rosa arvensis</i> (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
<i>Rubus fruticosus</i> agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Stellaria holostea</i> (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2
<i>Viola riviniana</i> (Hain-Veilchen)	F&B-BW-2

8 *Ajuga reptans* - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral; Böden mit günstiger Wasserversorgung, vorwiegend frische bis mäßig frische, seltener sehr frische Standorte; Mull bis Moder)

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	F&B-BW-1
<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Rhizomnium punctatum</i> (Punktirtes Wurzelsternmoos)	MoosBW2
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Senecio ovatus</i> (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
<i>Thelypteris phegopteris</i> (Buchenfarn)	F&B-BW-1

9 *Stachys sylvatica* - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral; frisch bis sehr frisch; Mull bis Moder)

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Equisetum sylvaticum</i> (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Rumex sanguineus</i> (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001

10 *Impatiens noli-tangere* - Gruppe

(schwach sauer bis alkalisch; feucht bis mäßig nass, häufig Standorte mit bewegter Feuchtigkeit; Mull bis Moder)

<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rüchmichnichtan)	Oberdf.2001

11 *Iris pseudacorus* - Gruppe

(weite ökolog. Amplitude bezügl. Bodenreaktion bei Schwerpunkt schwach sauer bis neutral; feuchte bis sehr nasse Standorte mit zeitweise hochanstehendem Grundwasser; Feuchtmull bis Bruchwald- (Anmoor-)Torf; überwiegend Auewald- und Erlenbruchwaldpflanzen)

<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Galium palustre</i> (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium palustre</i> (Sumpf-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001

Valeriana dioica (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001
Valeriana officinalis (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

12 Bupleurum falcatum - Gruppe

(mehr oder minder kalkholde Arten; überwiegend im mäßig trockenen bis trockenen Bereich; Mull)

Aster amellus (Kalk-Aster, Berg-Aster)	Oberdf.2001
Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
Gentianella ciliata (Gefranster-, Fransen-Enzian)	RL Farn/Sam 2000 BW
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
Inula salicina (Weiden-Alant)	Oberdf.2001
Laserpitium latifolium (Breitblättriges Laserkraut)	Oberdf.2001
Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	Oberdf.2001
Trifolium rubens (Purpur-Klee)	F&B-BW-3
Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

13 Lamium galeobdolon - Gruppe

(schwach sauer bis alkalisch; frisch bis feucht, selten mäßig frisch; Mull bis Mullmoder)

Arum maculatum (Aronstab)	Oberdf.2001
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Paris quadrifolia (Einbeere)	Oberdf.2001
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Vinca minor (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001

14 Asarum europaeum - Gruppe

(schwach sauer bis alkalisch; mäßig trocken bis frisch; Mull bis Mullmoder)

Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrespe)	Oberdf.2001
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Carex digitata (Finger-Segge)	Oberdf.2001
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
Galium odoratum (Waldmeister)	Oberdf.2001
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Hordelymus europaeus (Waldgerste)	Oberdf.2001
Lilium martagon (Türkenbund)	Oberdf.2001
Melica nutans (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
Neottia nidus-avis (Nestwurz)	Oberdf.2001
Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
Platanthera bifolia (Weiße-, Zweiblättrige Waldhyazinthe)	Oberdf.2001
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001
Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)	Oberdf.2001

15 Mercurialis perennis - Gruppe

(neutral bis alkalisch; mäßig trocken bis (sehr) frisch; Mull; kalkhaltige Böden)

Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001

16 Corydalis cava - Gruppe

(Bodenreaktion neutral bis alkalisch; Standorte frisch bis feucht; gute (Wasserversorgung vor allem im Frühjahr; Mull; Kleebwaldarten)

Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1

17 Carex flacca - Gruppe

(häufig auf tonigen Böden; mäßig sauer (bis neutral; wechselfeucht bis wechselfeucht oder mäßig trocken)

Betonica officinalis (Heilziest)	FlorL-BW98
Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001

18 Juncus - Gruppe

(häufig auf oberflächlich dichtgelagerten und/oder mechanisch verdichteten Böden; mäßig sauer bis schwach sauer, selten neutral; wechselfeucht bis feucht)

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
Juncus effusus (Flutter-Binse)	Oberdf.2001

19 Urtica dioica - Gruppe

(Stickstoff- und basenr. Standorte, reagiert schnell auf anthropog. Einflüsse wie N-Eintrag (Feldränder) oder auf N-Umsetzung nach Freilage/Auflichtung; häufig auch auf kolluvialen Böden; schw. sauer bis alkalisch; mtr bis feu; Mull bis Mullmoder)

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Atropa bella-donna (Tollkirsche)	Oberdf.2001
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchnabel)	Oberdf.2001
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001
Urtica dioica (Große Brennessel)	F&B-BW-2